



#NUTRIRE PROTEGENDO

CATALOGO 2026

MADE IN ITALY





Fertilidea® srl

Via Trav.sa Vic.le Messigno, 7
80045 Pompei (NA) Tel. e Fax 081 8508261

www.fertilidea.it info@fertilidea.it

whatsapp: 3355922525

Codice destinatario 5RU082D

P.IVA 05362441213

Fertilidea® - Cat. 01.02/26

CATALOGO UFFICIALE FERTILIDEA s.r.l. 2026

La nostra **MISSION** può essere racchiusa
in una sola formula:

#NUTRIREPROTEGGENDO

Fertilidea propone soluzioni biologiche per la nutrizione e la protezione delle colture, con un'attenzione costante alla salute del suolo e all'equilibrio naturale della pianta. Il catalogo raccoglie una selezione di inoculi micorrizici e fertilizzanti biologici pensati per favorire lo sviluppo radicale, migliorare l'assorbimento dei nutrienti e supportare la coltura nei momenti di stress.

La nostra filosofia è racchiusa in un principio semplice e concreto:
NUTRIRE PROTEGGENDO

Una pianta ben nutrita è una pianta più forte, più stabile e più pronta ad affrontare stress ambientali e condizioni difficili. La produttività non è solo resa, ma anche prevenzione, resilienza e rispetto dell'ambiente. Con Fertilidea, la nutrizione diventa un alleato naturale della protezione delle piante da tutto ciò che ne ostacola la crescita sana.

Un elemento distintivo del nostro lavoro è la produzione interna: nel laboratorio **FERTILAB** selezioniamo e moltiplichiamo microrganismi utili, garantendo controllo dei processi, standard costanti e formulazioni pensate per l'efficacia in campo.

L'efficacia delle nostre soluzioni nasce da un'attività costante di ricerca applicata e verifica in condizioni controllate.

Presso **FERTILSERRA**, la serra sperimentale Fertilidea, testiamo e valutiamo le nostre formulazioni in differenti condizioni colturali, con l'obiettivo di validarne le prestazioni agronomiche prima dell'introduzione sul mercato.

Nella serra vengono condotte prove su:

- **inoculi micorrizici e consorzi microbici**
- **fertilizzanti biologici e biostimolanti**
- **interazioni tra microrganismi e apparato radicale**
- **risposta delle colture a stress controllati (idrico, nutrizionale, termico)**

Le prove consentono di analizzare:

- **sviluppo radicale e grado di micorrizzazione**
- **vigoria vegetativa e uniformità di crescita**
- **efficienza nutrizionale**
- **comportamento fisiologico nelle diverse fasi fenologiche**

I risultati ottenuti in ambiente protetto vengono successivamente confrontati con prove in pieno campo, per garantire che i risultati osservati siano replicabili in condizioni operative reali.

L'integrazione tra **FERTILAB (laboratorio interno)** e **FERTILSERRA (serra sperimentale)** ci permette di controllare l'intero processo: dalla selezione e moltiplicazione dei microrganismi utili, alla verifica della loro efficacia agronomica.

Ogni soluzione Fertilidea nasce dalla ricerca e viene confermata
dall'esperienza sul campo.

La nostra specialità: gli INOCULI MICORRIZICI

Gli **inoculi micorrizici** rappresentano il cuore della proposta Fertilidea. Attraverso la selezione, la moltiplicazione e la formulazione di microrganismi utili nel laboratorio interno **FERTILAB**, sviluppiamo soluzioni mirate per valorizzare la simbiosi tra fungo e apparato radicale. E nella nostra serra sperimentale, **FERTILSERRA**, validiamo le nostre proposte.

La micorrizzazione non è solo un processo biologico, ma uno strumento agronomico strategico per migliorare efficienza nutrizionale, resilienza e protezione delle piante.

Le micorrize arbuscolari (VAM) instaurano una relazione simbiotica con la pianta, ampliando la superficie di esplorazione radicale attraverso la rete miceliare nel suolo.

Questo si traduce in:

- Maggiore disponibilità e assorbimento dei principali elementi presenti nel terreno (N, P, K) e microelementi
- Ottimizzazione dell'efficienza nutrizionale
- Sostegno alla pianta in condizioni di stress
- Miglior equilibrio biologico della rizosfera

Investire nella micorrizzazione significa rafforzare la pianta alla base, migliorando la funzionalità radicale e sostenendo la produttività nel tempo.

Per Fertilidea, gli inoculi micorrizici sono una scelta tecnica centrale per costruire colture più forti, suoli più vivi e risultati più stabili.

FERTILIDEA
Nutrire proteggendo, a partire dalle radici!



FERTILIZZANTI USO BIOLOGICO A BASE DI MICRORGANISMI

BIYO GRANULO METABIOS	12
BIYO GRANULO TOP	13
BIYO TABLET	14
LIFESTRONG VAM AMY	15
LIFESTRONG VAM L	16
LIFESTRONG VAM PLUS L	17
LIFESTRONG VAM SUPERB	18
LIFESTRONG VAM SUPERB HT	19

FERTILIZZANTI E PRODOTTI USO BIOLOGICO

ALGAPLUS PS	22
BIOALGAPLUS L	23
BIOLIFESTRONG	24
BIOMAXX	25
CHELA MN MANGANESE	26
CHELA ZN ZINCO	27
CHITOGARD	28
COBRE GREEN	29
CUPERDEM*	30
DIOXI BIG*	31
DIOXI GROW	32
DIOXI KIRA*	33
DIOXI MIRTO*	34
DIOXI TALOS*	35
DIOXI TSP*	36
ECKOSIL*	37
ETA-BOR	38
FEUCARPOS	39
KIPLANT ESSENCE*	40
LIFECOMPOST	41
LIFEN*	42
LIFESTRONG1	43
MAXX ORGANIC	44
ORMOSTING	45
SUPER MAXX	46
UMICO	47
VERDEMAS	48

* CONCIMI A MARCHIO CE

Tutte le materie prime utilizzate per formulare questo prodotto sono elencate nell'allegato II del Reg. (UE) 2021/1165 che ne autorizza l'utilizzo nella produzione biologica.

GEL DI SILICE** (Potenziatore delle difese delle piante. Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici ed abiotici)	49
---	----

** CORROBORANTE

PUO' ESSERE UTILIZZATO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

CHITO-IDEA*** (Chitosano cloridrato 2,0%)	50
DIOXI HOMERO*** (<i>Urtica spp.</i>)	51
DIOXI NEMATIX*** (<i>Urtica spp.</i>)	52
DIOXI OIL*** (Olio di girasole)	53
DIOXI PIRANA*** (Chitosano cloridrato 5,0%)	54
DIOXI SOLDIER*** (<i>Urtica spp.</i>)	55
KIPLANT REPRISE*** (Chitosano <i>Aspergillus niger</i> 1,5%)	56
MICROIL*** (Olio di girasole)	57
MISCELA DI SOSTANZE DI BASE*** (Lecitina ed <i>Equisetum arvense</i> L. Equiseto)	58
QUORUM ALLIANCE*** (Chitosano cloridrato 2,0%)	59

*** SOSTANZA DI BASE

Prodotto consentito in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2018/848 e del Reg. di esecuzione (UE) 2021/1165.

FERTILIZZANTI USO CONVENZIONALE

AZOLEMME	62
CABOR****	63
CAL WASH****	64
HARMONIA	65
HICAL***	66
KIPLANT HB15****	67
KIPLANT INDUCER****	68
OKSIACID****	69
PROSILK	70
QUANTICO	71
RAIZOOK****	72
SAL WASH	73

**** CONCIMI A MARCHIO CE

PRODOTTI COMPLEMENTARI

PODEROSO (Coadiuvante di crescita per le piante)	76
ROLL TRAP (Trappole entomologiche)	77
WHITE IBIZA (Ombreggiante per serra)	78
WHITE IBIZA CLEANER (Pulizia tetti serre)	79
WHITE IBIZA SIX (Regolatore di temperatura)	80

FERTILIZZANTI
**USO BIOLOGICO A BASE
DI MICRORGANISMI**

BIYO GRANULO METABIOS

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

Inoculo di funghi micorrizici

Tipo di ammendante organico: vermicompost da letame bovino

Contenuto in micorrize	1%
Contenuto in batteri della rizosfera (<i>Azospirillum spp.</i> , <i>Bacillus spp.</i>)	1 x10 ⁸ UFC/g

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: inoculi di funghi endomicorrizici, batteri autorizzati ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 1.9.6, del regolamento (UE) 2018/848, vermicompost da letame bovino non proveniente da allevamenti industriali, radici di sorgo.

Il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati ed organismi patogeni (salmonella, coliformi fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi).

CARATTERISTICHE

Biyo Granulo Metabios è un prodotto ad azione specifica sul suolo a base di Vermicompost da letame bovino, arricchito con inoculo di funghi endomicorrizici e batteri della rizosfera. L'apporto di sostanza organica stabile e di microrganismi utili favorisce l'attività biologica del terreno, migliorando le condizioni della rizosfera e la funzionalità del suolo. In particolare, il prodotto promuove la crescita e lo sviluppo nel suolo di funghi entomopatogeni quali *Metarhizium anisopliae*, *Metarhizium brunneum* e *Beauveria bassiana*, contribuendo a creare un ambiente microbiologico più equilibrato e attivo. Contiene inoltre probiotici di origine vegetale, distinti dalla matrice organica, utili a sostenere l'attività biologica del suolo e della rizosfera.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

BIYO GRANULO METABIOS si utilizza preferibilmente alla semina, al trapianto, al rinvaso e in generale nei momenti in cui è importante favorire l'attività biologica del suolo e della rizosfera. Per ottenere la massima efficacia è consigliata una distribuzione in prossimità delle radici (localizzata in buca, lungo la fila o in banda) seguita da una leggera incorporazione nel terreno (2–10 cm). Dopo l'applicazione è utile effettuare una irrigazione (o intervenire prima di una pioggia) per favorire l'attivazione dei microrganismi.

Dosi indicative:

- Orticole e floricole trapiantate: 10–20 g per pianta, con possibile seconda applicazione nelle colture lunghe o su terreni poveri.
- Piante in vaso: 5–15 g per vaso in base al volume del contenitore.
- Arboree: distribuire sottochioma/sottofila con leggera incorporazione e irrigazione; dose: 10–20 g per pianta.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati, in ogni caso è sempre bene effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

AVVERTENZE

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 30°C. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

CONFEZIONE

Busta da 1 kg

Disponibile, su richiesta, anche in confezioni di peso diverso.

BIYO GRANULO TOP

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

Inoculo di funghi micorrizici

Tipo di ammendante organico: vermicompost da letame bovino

Contenuto in micorrize	1%
Contenuto in batteri della rizosfera (<i>Bacillus spp.</i> , <i>Pseudomonas spp.</i> , <i>Azospirillum spp.</i>)	1 x10 ⁸ UFC/g
Contenuto in <i>Trichoderma</i>	1 x10 ⁸ UFC/g

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: inoculi di funghi endomicorrizici, batteri autorizzati ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 1.9.6, del regolamento (UE) 2018/848, vermicompost da letame bovino non proveniente da allevamenti industriali, radici di sorgo e *Trichoderma*.

Il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati ed organismi patogeni (salmonella, coliformi fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi).

CARATTERISTICHE

Biyo Granulo Top è un prodotto ad azione specifica ad azione sul suolo, formulato su ammendante organico (vermicompost da letamebovino) e arricchito con microrganismi utili: funghi endomicorrizici, batteri della rizosfera e 3 ceppi di *Trichoderma*. Il *Trichoderma* è un fungo naturalmente presente nel terreno che colonizza la rizosfera e la superficie radicale, contribuendo a creare un ambiente biologicamente attivo e favorevole allo sviluppo dell'apparato radicale. La sua presenza nel suolo supporta l'equilibrio microbiologico e i processi di trasformazione della sostanza organica, favorendo una migliore disponibilità degli elementi nutritivi e una più efficiente esplorazione del volume di terreno da parte delle radici. In sinergia con micorrize e batteri della rizosfera, il *Trichoderma* aiuta a migliorare vitalità e funzionalità della rizosfera, con effetti positivi su attecchimento e ripresa vegetativa. Il prodotto contiene inoltre probiotici di origine vegetale, distinti dalla matrice organica, utili a sostenere l'attività biologica del suolo e della rizosfera.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

BIYO GRANULO TOP si utilizza preferibilmente alla semina, al trapianto, al rinvaso e in generale nei momenti in cui è importante favorire l'attività biologica del suolo e della rizosfera. Per ottenere la massima efficacia è consigliata una distribuzione in prossimità delle radici (localizzata in buca, lungo la fila o in banda) seguita da una leggera incorporazione nel terreno (2–10 cm). Dopo l'applicazione è utile effettuare una irrigazione (o intervenire prima di una pioggia) per favorire l'attivazione dei microrganismi.

Dosi indicative:

- Orticole e floricole trapiantate: 10–20 g per pianta, con possibile seconda applicazione nelle colture lunghe o su terreni poveri.
- Piante in vaso: 5–15 g per vaso in base al volume del contenitore.
- Arboree: distribuire sottochioma/sottofila con leggera incorporazione e irrigazione; dose: 10–20 g per pianta.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati, in ogni caso è sempre bene effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

AVVERTENZE

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 30°C. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

CONFEZIONE

Busta da 1 kg

Disponibile, su richiesta, anche in confezioni di peso diverso.

BIYO TABLET

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

Inoculo di funghi micorrizici

Tipo di ammendante organico: vermicompost da letame

Contenuto in micorrize	1%
Contenuto in batteri della rizosfera (<i>Bacillus spp.</i> , <i>Pseudomonas spp.</i>)	1x10 ⁷ UFC/g

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: Inoculo di funghi endomicorrizici, batteri autorizzati ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 1.9.6, del regolamento (UE) 2018/848, vermicompost da letame bovino non proveniente da allevamenti industriali, radici di sorgo.

Il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati ed organismi patogeni (salmonella, coliformi fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi).

CARATTERISTICHE

Biyo Tablet è un prodotto ad azione specifica a base di micorrize che accelera la crescita iniziale della pianta, riducendo lo stress dopo il trapianto e aumentando così il trasporto dei nutrienti. BIYO TABLET migliora la qualità del suolo e lo sviluppo delle piante perché aiuta a rendere omogenea la disponibilità e l'accessibilità dei nutrienti per le piante. Aumenta la frazione di fosforo assimilabile. Rende i terreni più permeabili all'acqua e aiuta a trasportare l'acqua dai livelli più profondi alla superficie.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

BIYO TABLET si usa applicandolo in prossimità della pianta. In frutticoltura si consigliano 2 pastiglie per pianta; in orticoltura e florovivaismo ornamentale, 1 pastiglia per pianta/vaso.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati, pur tuttavia è sempre consigliato effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

AVVERTENZE

Il prodotto è stabile a temperatura e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 30°C. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

CONFEZIONE

Secchiello da 10kg (circa 1500 pastiglie)
Disponibile, su richiesta, anche in confezioni di peso inferiore.

LIFESTRONG VAM AMY

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

Inoculo di funghi micorrizici

Tipo di ammendante organico: torba neutra

Contenuto in micorrize	1%
Contenuto in batteri della rizosfera (<i>Bacillus spp.</i>)	1×10^{11} UFC/g

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: Inoculo di funghi endomicorrizici, batteri autorizzati ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 1.9.6, del regolamento (UE) 2018/848, ammendante prodotto senza legname trattato chimicamente dopo l'abbattimento, radici di sorgo.

Il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati ed organismi patogeni (salmonella, coliformi fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi).

CARATTERISTICHE

Lifestrong Vam Amy si usa prevalentemente per il trattamento dei suoli o dei terricciati allo scopo di incrementarne il contenuto in batteri della rizosfera e micorrize. Il prodotto agisce attivando la radice, in maniera da incrementarne il volume.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

LIFESTRONG VAM AMY deve essere diluito in acqua per le applicazioni. Versarne la quantità desiderata in un recipiente vuoto, aggiungendo l'acqua per la diluizione a più riprese in piccole quantità, omogeneizzando ogni volta. Generalmente viene utilizzato alla dose di 4-5 litri/ha in 2-3 applicazioni per ciclo culturale.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati, pur tuttavia è sempre consigliato effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

AVVERTENZE

Il prodotto è stabile a temperatura e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 10°C. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

CONFEZIONE

Bottiglia da 1L in cartone 12x1L

Tanica da 5L in cartone 4x5L

Tanica da 10L

Peso netto: 1kg = 1L

LIFESTRONG VAM L

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

Inoculo di funghi micorrizici

Tipo di ammendante organico: torba neutra

Contenuto in micorrize	1%
Contenuto in batteri della rizosfera (<i>Bacillus</i> spp., <i>Pseudomonas</i> spp., <i>Azospirillum</i> spp.)	1x10 ⁸ UFC/g
Contenuto in <i>Trichoderma</i>	1x10 ⁸ UFC/g

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: Inoculo di funghi endomicorrizici, batteri autorizzati ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 1.9.6, del regolamento (UE) 2018/848, ammendante prodotto senza legname trattato chimicamente dopo l'abbattimento, radici di sorgo e *Trichoderma*.

Il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati ed organismi patogeni (salmonella, coliformi fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi).

CARATTERISTICHE

Lifestrong Vam L è un prodotto usato per il trattamento di semi e delle piante allo scopo di aumentare la resistenza a stress sia di natura biotica (patogeni, fitofagi, ecc.) sia di natura abiotica (termici, nutrizionali, fitotossicità, stanchezza del terreno, ecc.). È un prodotto ad azione specifica. Il suo utilizzo migliora la crescita e lo sviluppo dell'apparato radicale e fogliare, aumentando così la produttività anche in presenza di stress di natura abiotica.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

LIFESTRONG VAM L si impiega diluendolo in acqua. Versarne la quantità desiderata in un recipiente vuoto, aggiungendo l'acqua per la diluizione a più riprese in piccole quantità, omogeneizzando ogni volta. Generalmente è utilizzato alla dose di 2-4 litri/ettaro distribuiti nell'intero ciclo vegetativo delle piante da trattare.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati, pur tuttavia è sempre consigliato effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

AVVERTENZE

Il prodotto è stabile a temperatura e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 10°C. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

CONFEZIONE

Bottiglia da 1L in cartone 12x1L
Tanica da 5L in cartone 4x5L
Tanica da 10L

Peso netto: 1kg = 1L

LIFESTRONG VAM PLUS L

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

Inoculo di funghi micorrizici

Tipo di ammendante organico: torba neutra

Contenuto in micorrize	1%
Contenuto in batteri della rizosfera (<i>Azospirillum spp.</i> , <i>Bacillus spp.</i>)	1x10 ⁸ UFC/g

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: Inoculo di funghi endomicorrizici, batteri autorizzati ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 1.9.6, del regolamento (UE) 2018/848, ammendante prodotto senza legname trattato chimicamente dopo l'abbattimento, radici di sorgo.

Il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati ed organismi patogeni (salmonella, coliformi fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi).

CARATTERISTICHE

Lifestrong Vam Plus L è usato per il trattamento dei semi e delle piante allo scopo di aumentare la resistenza a stress sia di natura biotica (patogeni, fitofagi, ecc.) sia di natura abiotica (termici, nutrizionali, fitotossicità, stanchezza del terreno, ecc.). È un prodotto ad azione specifica che promuove la crescita dei funghi della rizosfera (*Paecilomyces lilacinus*, *Beauveria bassiana*, *Paecilomyces fumosoroseus*, *Metarhizium anisopliae*, *Verticillium lecanii*) contribuendo così ad aumentare le difese della pianta. Il suo utilizzo migliora la crescita e lo sviluppo dell'apparato radicale e fogliare. Inoltre, si evidenzia una maggiore produttività anche in presenza di stress di natura abiotica.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

LIFESTRONG VAM PLUS L si impiega diluendolo opportunamente in acqua per le varie applicazioni. Versarne la quantità desiderata in un recipiente vuoto, aggiungendo l'acqua per la diluizione a più riprese in piccole quantità, omogeneizzando ogni volta. Si utilizza alla dose di 2-3 litri/ettaro.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati, pur tuttavia è sempre consigliato effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

AVVERTENZE

Il prodotto è stabile a temperatura e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 10°C. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

CONFEZIONE

Bottiglia da 1L in cartone 12x1L

Tanica da 5L in cartone 4x5L

Tanica da 10L

Peso netto: 1kg = 1L

LIFESTRONG VAM SUPERB

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

Inoculo di funghi micorrizici

Tipo di ammendante organico: torba neutra

Contenuto in micorrize	1%
Contenuto in batteri della rizosfera (<i>Bacillus</i> spp., <i>Pseudomonas</i> spp., <i>Azospirillum</i> spp.)	1x10 ⁸ UFC/g

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: Inoculo di funghi endomicorrizici, batteri autorizzati ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 1.9.6, del regolamento (UE) 2018/848, ammendante prodotto senza legname trattato chimicamente dopo l'abbattimento, radici di sorgo.

Il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati ed organismi patogeni (salmonella, coliformi fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi).

CARATTERISTICHE

Lifstrong Vam Superb si usa prevalentemente per il trattamento del suolo o del terriccio allo scopo di aumentarne il normale contenuto di funghi e batteri benefici. I ceppi e le specie contenute agiscono come rivitalizzanti microbici del suolo e attivatori della radice; favoriscono la solubilizzazione dei fosfati retrogradati e la fissazione dell'azoto, riducendo così la necessità di tali elementi in pre-semina o pre-impianto con ovvi risvolti economici ed ambientali. Le micorrize stimolano l'aumento delle radici e partecipano alla loro protezione attiva.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

LIFESTRONG VAM SUPERB deve essere diluito in acqua per le applicazioni. Versarne la quantità desiderata in un recipiente vuoto, aggiungendo l'acqua per la diluizione a più riprese in piccole quantità, omogeneizzando ogni volta. Generalmente viene utilizzato alla dose di 5-10 litri/ettaro sia con colture in atto che in pre-semina.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati, pur tuttavia è sempre consigliato effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

AVVERTENZE

Il prodotto è stabile a temperatura e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 10°C. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

CONFEZIONE

Bottiglia da 1L in cartone 12x1L

Tanica da 5L in cartone 4x5L

Tanica da 10L

Peso netto: 1kg = 1L

LIFESTRONG VAM SUPERB HT

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

Inoculo di funghi micorrizici

Tipo di ammendante organico: torba neutra

Contenuto in micorrize	1%
Contenuto in batteri della rizosfera (<i>Bacillus spp.</i> , <i>Pseudomonas spp.</i> , <i>Azospirillum spp.</i>)	1x10 ⁸ UFC/g
Contenuto in <i>Trichoderma</i>	1x10 ⁸ UFC/g

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: Inoculo di funghi endomicorrizici, batteri autorizzati ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 1.9.6, del regolamento (UE) 2018/848, ammendante prodotto senza legname trattato chimicamente dopo l'abbattimento, radici di sorgo e *Trichoderma*.

Il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati ed organismi patogeni (salmonella, coliformi fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi).

CARATTERISTICHE

Lifestrong Vam Superb HT è un prodotto studiato per andare incontro alle esigenze di un'agricoltura moderna, volta a produrre prodotti più sani, partendo da una migliore gestione del terreno e potenziandone la flora utile. Contiene due ceppi di *Trichoderma*, fondamentali per aumentare la resistenza endogena della pianta alle malattie e grazie alle sue proprietà biostimolanti per favorirne la crescita e la resistenza agli stress biotici ed abiotici. La presenza di batteri della rizosfera è importante per la loro capacità di solubilizzare i fosfati retrogradati e di fissare l'azoto. Le micorrize stimolano lo sviluppo dell'apparato radicale, così importante per una pianta sana e produttiva.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

LIFESTRONG VAM SUPERB HT deve essere diluito in acqua per le applicazioni. Versarne la quantità desiderata in un recipiente vuoto, aggiungendo l'acqua per la diluizione a più riprese in piccole quantità, omogeneizzando ogni volta. Generalmente viene utilizzato alla dose di 5-10 litri/ettaro sia con colture in atto che in pre-semina.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati, pur tuttavia è sempre consigliato effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

AVVERTENZE

Il prodotto è stabile a temperatura e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 10°C. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

CONFEZIONE

Bottiglia da 1L in cartone 12x1L
Tanica da 5L in cartone 4x5L
Tanica da 10L

Peso netto: 1kg = 1L

FERTILIZZANTI E PRODOTTI **USO BIOLOGICO**

ALGAPLUS PS

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Estratto di alghe in forma solida

Azoto (N) organico	1%
Ossido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua	19%
Betaine	0,1%
Mannitolo	4%
Carbonio (C) organico	20%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: prodotto a base di alghe ottenuto direttamente mediante estrazione alcalina, derivante solo da produzione biologica o sostenibile conformemente all'allegato II, parte III, punto 2.4 del Reg. (UE) 2018/848.

CARATTERISTICHE

Algaplus Ps viene estratto dalle alghe della specie *Ascophyllum nodosum*. Contiene osmoprotettori come betaine, agenti naturali (mannitolo e acido alginico) che aiutano il trasporto dei nutrienti, precursori e stimolatori della produzione endogena di fitormoni (ad esempio, le citochinine) e polisaccaridi che possono aumentare la resistenza ad avversità e stress ambientali (laminarina ed oligosaccaridi), nonché aminoacidi. Migliora la resistenza agli stress, soprattutto agli sbalzi di temperatura e al forte caldo. Aumenta il potenziale osmotico, favorendo l'accumulo di acqua, e rende più vigorosa la pianta; aumenta la produzione di fitoalessine. Favorisce lo sviluppo della microflora nel suolo, aumentando la disponibilità dei nutrienti; aumenta l'assimilazione di azoto e dei complessi fosfato-umati.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Algaplus PS si utilizza nei trattamenti fogliari e radicali secondo il seguente schema:

- Trattamenti fogliari: 70-100g/100 litri in tutte le fasi vegetative
- Trattamenti radicali: 1-2,5 kg/ettaro

COMPATIBILITÀ

È un prodotto naturale e non presenta controindicazioni, pur tuttavia, vista la grande quantità di specie e varietà coltivate, è bene eseguire piccoli saggi di fitotossicità preliminari. Si raccomanda di consultare il nostro Ufficio Tecnico per qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato.

AVVERTENZE

Tenere fuori della portata dei bambini. Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri.

CONFEZIONE

Sacchetto da 1kg in cartone 15x1kg
Sacco da 20kg

Peso netto: 1kg-20kg

BIOALGAPLUS L

CONCIME ORGANICO AZOTATO

Estratto fluido di lievito contenente alghe brune

N 1,4 + C 10

Azoto (N) organico	1,4%
Carbonio (C) organico	10%
Sostanza Organica con peso molecolare nominale <50KDa	30%
pH	7,2

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: prodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione e prodotto a base di alghe ottenuto direttamente mediante estrazione alcalina, derivante solo da produzione biologica o sostenibile conformemente all'allegato II, parte III, punto 2.4 del Reg. (UE) 2018/848.

CARATTERISTICHE

Bioalgaplus L è una soluzione a base di alghe appartenenti alla specie *Ascophyllum nodosum* ricche di betadine, di agenti che aiutano il trasporto dei nutrienti, di citochinine (precursori e stimolatori della produzione di fitormoni), di polisaccaridi che possono aumentare la resistenza alle avversità, nonché di aminoacidi. Il suo utilizzo migliora la resistenza della pianta agli stress, soprattutto agli sbalzi di temperatura e al forte caldo. Aumenta il potenziale osmotico, favorendo l'accumulo di acqua. Stimola e rende più vigorosa la pianta; aumenta il contenuto di fitoalessine. Favorisce lo sviluppo della microflora nel suolo aumentando la disponibilità di nutrienti; aumenta l'assimilazione di azoto e dei complessi fosfato-umati.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

BIOALGAPLUS L si utilizza nei trattamenti fogliari e radicali secondo il seguente schema:

- Trattamenti fogliari: 150 -250cc/100 litri
- Trattamenti radicali: 2-5litri/ettaro

COMPATIBILITÀ

È un prodotto naturale e non presenta controindicazioni, pur tuttavia, vista la grande quantità di specie e varietà coltivate, è bene eseguire piccoli saggi di fitotossicità preliminari. Si raccomanda di consultare il nostro Ufficio Tecnico per qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato.

AVVERTENZE

Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 32°C. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

CONFEZIONE

Bottiglia da 1L in cartone 12x1L

Tanica da 5L in cartone 4x5L

Tanica da 10L

Peso netto: 1,19 kg=1L

BIOLIFESTRONG

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

Idrolizzato proteico di erba medica

Azoto (N) organico	11%
Carbonio (C) organico	25%
Aminoacidi totali	70%
Aminoacidi liberi	60%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: Idrolizzato proteico di erba medica.

CARATTERISTICHE

Biolifstrong è un prodotto biostimolante ottenuto per idrolisi enzimatica di erba medica. La caratteristica principale del processo enzimatico garantisce un elevato quantitativo di aminoacidi liberi biologicamente attivi. L'elevato rapporto qualità/prezzo ne permette un uso in tutti quei momenti di riconosciuto fabbisogno delle piante a partire dalla germinazione dei semi, alla crescita vegetativa fino all'ingrossamento dei frutti. Si presta all'uso in miscela con HICAL e QUANTICO.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

BIOLIFESTRONG si utilizza nei trattamenti fogliari e radicali secondo il seguente schema:

- Trattamenti fogliari: 100-150g/100litri.
- Trattamenti radicali: 2-3 kg/ettaro.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è miscelabile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti. Non miscelare con i prodotti contenenti zolfo, oli minerali o prodotti molto alcalini. Il fabbricante garantisce la composizione del prodotto, sul cui uso possono influire numerosi fattori (preparazione della miscela, applicazioni, condizioni meteorologiche), per cui si consiglia di utilizzare il prodotto sotto il controllo tecnico. È un prodotto naturale e non presenta controindicazioni, pur tuttavia, vista la grande quantità di specie e varietà coltivate, è bene eseguire piccoli saggi di fitotossicità preliminari. Si raccomanda di consultare il nostro Ufficio Tecnico per qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato.

AVVERTENZE

Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

CONFEZIONE

Sacchetto da 1kg-5kg
Sacco da 20kg

Peso netto: 1kg-5kg-20kg

BIOMAXX

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

Idrolizzato proteico di erba medica

Carbonio (C) organico	25%
Azoto (N) organico	10%
Aminoacidi totali	80%
Aminoacidi liberi	70%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione (idrolizzato di erba medica).

CARATTERISTICHE

Biomaxx è un prodotto biostimolante che si ottiene mediante un complesso processo di idrolisi enzimatica nel quale gli enzimi proteolitici frazionano le proteine, identificando e selezionando determinate sequenze di aminoacidi. Tale processo dà come risultato un prodotto molto ricco di aminoacidi liberi. L'alta qualità e la purezza di BIOMAXX permettono di moltiplicare l'attività degli aminoacidi tradizionali. BIOMAXX è molto efficace nel far superare alla pianta condizioni di stress, favorisce la fioritura, facilita e potenzia la funzione enzimatica, aumenta la fotosintesi, migliora la produzione e la qualità del frutto.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

BIOMAXX si utilizza nei trattamenti fogliari e radicali secondo il seguente schema:

- Trattamenti fogliari: 50-100g/100 litri ripetuto secondo necessità.
- Trattamenti radicali: 1-2 kg/ettaro ripetuto secondo necessità.

COMPATIBILITÀ

BIOMAXX è miscelabile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti. Non miscelare con prodotti contenenti zolfo, oli minerali o prodotti molto alcalini. Il fabbricante garantisce la composizione del prodotto, sul cui uso possono influire numerosi fattori (preparazione della miscela, applicazioni, condizioni meteorologiche), per cui si consiglia di utilizzare sotto il controllo tecnico. Vista la grande quantità di specie e varietà coltivate, è bene eseguire piccoli saggi di fitotossicità preliminare. Si raccomanda di consultare il nostro Ufficio Tecnico per qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato.

AVVERTENZE

Conservare il prodotto a temperature comprese tra 5°C e 32°C. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

CONFEZIONE

Sacchetto da 1kg in cartone 12x1kg

Peso netto: 1kg

CHELA MN MANGANESE

CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI

Chelato di Manganese (Mn) EDTA

Manganese (Mn) solubile in acqua	13%
Manganese (Mn) chelato con EDTA	13%
Agente chelante EDTA. Intervallo di pH che assicura stabilità alla frazione chelata:	4-11

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: chelato di manganese (EDTA).

CARATTERISTICHE

Chela Mn Manganese è un concime a base di manganese chelato altamente solubile in acqua e dotato di elevata penetrazione cuticolare e stabilità. Il manganese è un elemento che interviene in maniera fondamentale nel processo di fotosintesi clorofilliana; l'impiego di Chela Mn Manganese previene e riduce i sintomi causati da carenze di questo elemento esaltando inoltre il colore verde delle foglie. Chela Mn Manganese agisce in modo positivo anche sull'incremento della resistenza delle piante al freddo e delle rese produttive.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

CHELA MN MANGANESE si utilizza nei trattamenti fogliari e radicali secondo il seguente schema:

Trattamenti fogliari:

- Fruttifere 50 - 100g/100litri
- Floricole 50-100g/100litri
- Orticole 40 - 60g/100litri
- Industriali 80 - 120g/100litri

In fertirrigazione la dose indicativa è di 5kg/ettaro. In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.) non applicare per via fogliare e ridurre le dosi consigliate del 20 - 25%. L'applicazione fogliare del prodotto va eseguita nelle ore più fresche e serene della giornata. Non applicare durante la fioritura e la fase di invaiatura.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati, pur tuttavia è sempre consigliato effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

AVVERTENZE

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non disperdere i vuoti nell'ambiente. Da non vendersi sfuso. Il produttore, il distributore ed i rivenditori declinano ogni responsabilità per l'errata conservazione, manipolazione ed applicazione del prodotto.

CONFEZIONE

Busta da 1 kg

Disponibile, su richiesta, anche in confezioni di peso diverso.

CHELA ZN ZINCO

CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI

Chelato di zinco (Zn) EDTA

Zinco (Zn) solubile in acqua	15%
Zinco (Zn) chelato con EDTA	15%
Agente chelante EDTA. Intervallo di pH che assicura stabilità alla frazione chelata:	4-11

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: chelato di zinco (EDTA).

CARATTERISTICHE

Chela Zn Zinco è un concime a base di zinco chelato altamente solubile in acqua. Grazie alla sua elevata stabilità e penetrazione cuticolare Chela Zn Zinco consente di prevenire e ridurre i sintomi causati da carenze di zinco e di incrementare la produzione e la colorazione dei frutti. L'impiego di Chela Zn Zinco consente inoltre di prevenire la cascola dei frutticini e favorire lo sviluppo radicale.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

CHELA ZN ZINCO si utilizza nei trattamenti fogliari e radicali secondo il seguente schema:

Trattamenti fogliari:

- Fruttifere 50 - 100g/100litri
- Floricole 75-150g/100litri
- Orticole 40 - 60g/100litri
- Industriali 80 - 120g/100litri

Trattamenti radicali:

In fertirrigazione la dose indicativa è di 5kg/ettaro.

L'applicazione fogliare del prodotto va eseguita nelle ore più fresche e serene della giornata. Non applicare durante la fioritura.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati, pur tuttavia è sempre consigliato effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

AVVERTENZE

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non disperdere i vuoti nell'ambiente. Da non vendersi sfuso. Il produttore, il distributore ed i rivenditori declinano ogni responsabilità per l'errata conservazione, manipolazione ed applicazione del prodotto.

CONFEZIONE

Busta da 1 kg

Disponibile, su richiesta, anche in confezioni di peso diverso.

CHITOGARD

MISCELA DI MICROELEMENTI FLUIDA

Manganese (Mn) solfato e Zinco (Zn) solfato

Manganese (Mn) solfato, solubile in acqua	1,0%
Zinco (Zn) solfato, solubile in acqua	1,0%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: Sale di manganese (solfato) e sale di zinco (solfato).

CARATTERISTICHE

Chitogard è un ottimo concime che rinforza la crescita delle piante rendendole più vigorose e sane. Contiene microelementi solfati che aumentano il vigore della pianta. Aiuta lo sviluppo radicale se usato in fertirrigazione. La elevata capacità di nutrizione del CHITOGARD rende la pianta più vigorosa e permette un ispessimento di tessuti e pareti cellulari tali da bloccare anche la penetrazione di sostanze indesiderate e la loro diffusione, nonché una veloce produzione di fitoalessine ed enzimi idrolitici. Incrementa anche la shelflife senza influenzare i processi di maturazione e le caratteristiche organolettiche del frutto.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

CHITOGARD si utilizza nei trattamenti fogliari e radicali secondo il seguente schema:

- Trattamenti fogliari: 2-3 litri/ettaro.
- Trattamenti radicali: 2-4 litri/ettaro.

COMPATIBILITÀ

Evitare associazioni con prodotti a base di zolfo ed oli. Per altre miscele è consigliabile un saggio preliminare visto l'elevato numero di specie e varietà. Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione. Da non vendersi sfuso.

AVVERTENZE

Conservare il prodotto a temperature comprese tra 5°C e 32°C. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

Contiene: **SOLFATO DI ZINCO**



Pericolo

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P280 Proteggere gli occhi / il viso.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

UFI: HSYX-K1MH-C00E-MAQU

CONFEZIONE

Bottiglia da 1L in cartone 12x1L

Tanica da 5L in cartone 4x5L

Tanica da 10L

Peso netto: 1,03kg=1L

COBRE GREEN

CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI

Soluzione di concime a base di Rame (Cu) HGA

Rame (Cu) solubile in acqua	7%
Rame (Cu) complessato con HGA	7%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: Rame complessato con HGA.

CARATTERISTICHE

Cobre Green sopperisce alle carenze di rame, complessato con acidi organici e presentato come una soluzione liquida altamente concentrata. Penetra sistematicamente nella pianta, ottenendo un'assimilazione efficace. L'apporto di rame è essenziale per la maggior parte delle colture, poiché è molto importante nella crescita e nella nutrizione della pianta, essendo un costituente essenziale delle pareti cellulari. È essenziale per la traspirazione delle piante e le aiuta nel metabolismo dei carboidrati e delle proteine.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Applicazione fogliare:

- Agrumi, fruttiferi e frutti tropicali: 400-500 cm³/hL.
- Orticole: 350-400 cm³/hL. Applicare durante tutto il ciclo vegetativo. In coltura protetta iniziare 9-10 giorni dopo l'allegagione e proseguire ad intervalli di 7-10 giorni.
- Floreali e ornamentali: 350-400 cm³/hL. Intervenire durante tutto il ciclo vegetativo.
- Olivo e vite: 300-450 cm³/hL.

Fertirrigazione:

- Agrumi e alberi da frutto: 5-7 L/Ha. Ripetere le applicazioni ogni 15 giorni.
- Orticole, floricole e ornamentali: 4-5 L/Ha.
- Frutti tropicali: 4-6 L/Ha a settimana.
- Olivo e vite: 5-7 L/Ha, 3-4 applicazioni.

COMPATIBILITÀ

COBRE GREEN è compatibile con la maggior parte dei fertilizzanti e fitosanitari normalmente utilizzati, anche se è consigliabile non miscelarlo con soluzioni madre molto acide (pH<3). Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

AVVERTENZE

Conservare il prodotto a temperature comprese tra 5°C e 35°C. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

Contiene: SOLFATO DI RAME PENTAIDRATO



Pericolo

H302 Nocivo se ingerito. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:

P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi, proteggere gli occhi/il viso e proteggere l'udito.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

UFI: FM00-GOMP-5002-9JEF

CONFEZIONE

Tanica da 5L-20L

Peso netto: 1,2kg=1L

CE CUPERDEM

CONCIME INORGANICO SEMPLICE A BASE DI MICROELEMENTI

Concime complessato a base di microelementi

Rame (Cu) HGA

IN SOLUZIONE

Tenore dichiarato di nutrienti in massa:

Rame (Cu) complessato con HGA, idrosolubile	6%
---	----

INGREDIENTI

Glucopeptonato di rame ¹ (EC n° 946-272-2)

¹CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo

USO E DOSI:

Applicazione fogliare: Vite 200-300 ml per 100 L d'acqua durante la vegetazione ed a seconda delle condizioni atmosferiche.

Verdure: 200-400 ml per 100 litri di acqua, a seconda delle condizioni e della coltura.

Uliveto: 200-300 ml per 100 L d'acqua in primavera, durante lo sviluppo dei frutti e in autunno.

Agrumi: 150-200 ml per 100 L d'acqua in autunno.

Spazi verdi :200-400 ml per 100 litri d'acqua, a seconda delle condizioni atmosferiche.

Applicazione al suolo: Nella maggior parte delle colture 3 -5 l/ha.

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

CUPERDEM è un prodotto organico a base di Rame complessato. Questa complessazione del rame rende stabile il prodotto, in un ampio intervallo di pH e consente una più facile assimilazione e traslocazione all'interno della pianta. La stessa complessazione impedisce al rame di precipitare in forme insolubili nel terreno. Tra i vari vantaggi agronomici, CUPERDEM si distingue per la sua azione a livello dei processi enzimatici, migliorando la salute delle piante, riducendo i disturbi fisiologici e favorendo la fotosintesi. CUPERDEM si integra immediatamente nel sistema vascolare, proteggendo le cellule delle pareti interne dei vasi che conducono la linfa. Facilmente assimilabile, il Rame CUPERDEM non viene dilavato dalla pioggia, il che consente un'efficace riduzione dell'impiego del rame nella pratica agricola.

CONDIZIONI DI MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a temperatura e pressione ordinaria. Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 30°C.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E SULL'AMBIENTE



Attenzione
Indicazioni di pericolo:
H302 Nocivo se ingerito.

Consigli di prudenza:

P264 Lavare accuratamente ... dopo l'uso.

P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE: in presenza di malessere contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/...

P330 Sciacquare la bocca.

UFI: S8H7-4K0J-H31N-1MTV

ALTRE INFORMAZIONI:

Tutte le materie prime utilizzate per formulare questo prodotto sono elencate nell'allegato II del Reg. (UE) 2021/1165 che ne autorizza l'utilizzo nella produzione biologica. Tuttavia, prima dell'impiego consultare il proprio Organismo di Controllo e Certificazione Bio.

CONFEZIONE

Bottiglia da 1L in cartone 12x1L

Tanica da 5L in cartone 4x5L

Contenuto netto: 1L-5L

CE DIOXI BIG

CONCIME INORGANICO SEMPLICE A BASE DI MICROELEMENTI

Boro (B) e Molibdeno (Mo)

In soluzione

Tenore dichiarato di nutrienti in massa:

Boro (B) ossiacido, idrosolubile	0,4%
Molibdeno (Mo) sodio, idrosolubile	1,6%

INGREDIENTI

Acido borico¹ (CAS n° 10043-35-3); Molibdato di sodio¹ (CAS n° 10102-40-6)

¹ CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo

ISTRUZIONI PER L'USO

Può essere applicato a tutti i tipi di colture per via fogliare o radicale. Le colture che richiedono questo elemento sono le cucurbitacee, le crucifere, le leguminose e gli alberi da frutto. La dose di utilizzo è 75-100 cc/100 L di acqua a seconda della coltura e dello stadio fenologico della pianta. Colture orticole: trattamento fogliare 75-100 cc/100 L di acqua ripetendo l'applicazione ogni 10 giorni. Drupacee e pomacee: trattamento fogliare alla dose di 75-100 cc/100 L di acqua dall'inizio della fioritura; seconda applicazione alla caduta dei petali e all'allegagione; terza applicazione all'epoca dell'ingrossamento dei frutti (dopo il diradamento). Uva da tavola: 75-100 cc/100 L di acqua quando gli acini hanno la dimensione di un pisello; seconda applicazione 8 giorni dopo la chiusura del grappolo e terza applicazione all'invaiaitura. Per le altre colture: trattamento fogliare: 75-100 cc/100L di acqua con 2-4 applicazioni fogliari distanziate di 10-15 giorni nei periodi in cui si desidera una maggiore allegagione e ingrossamento dei frutti. Nei trattamenti radicali Dioxi Big si usa alla dose di 1 litro/ha per ogni applicazione.

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

DIOXI BIG è una miscela liquida di micronutrienti (boro e molibdeno) realizzata per la fase di fioritura ed allegagione della pianta. Miscela essenziale per la divisione cellulare; promuove le attività metaboliche regolando le funzioni cellulari. Dioxi Big è utile per le carenze di boro e molibdeno.

CONDIZIONI DI MAGAZZINAGGIO

Conservare il prodotto nei contenitori originali. Tenere i contenitori chiusi quando non vengono utilizzati. Evitare di esporre il prodotto direttamente al sole. Conservare in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato, lontano da tutte le fonti di calore, radiazione ed elettricità, a una temperatura compresa tra 5 e 35°C.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E SULL'AMBIENTE



Pericolo

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.

Consigli di prudenza:

P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.

P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso.

P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Contiene acido borico

Uso ristretto agli utilizzatori professionali

UFI: N000-W09R-D00A-T6E2

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il produttore garantisce la composizione, la formulazione e il contenuto del prodotto. L'utente sarà responsabile dei danni causati dalla totale inosservanza e parte delle istruzioni del prodotto dichiarate in questa etichettatura, allo stesso modo per un uso improprio del prodotto al di fuori delle indicazioni dettagliate, in quanto il prodotto potrebbe subire variazioni dovute dalle condizioni di utilizzo, alla conservazione, al contatto, all'ambiente, alla manipolazione e/o sottoposto a processo. Agrobiology Crop Nutrition S.L.U. non accetta responsabilità per le conseguenze derivanti dall'uso o abuso dei propri prodotti in condizioni particolari.

Tutte le materie prime utilizzate per formulare questo prodotto sono elencate nell'allegato II del Reg. (UE) 2021/1165 che ne autorizza l'utilizzo nella produzione biologica.

Tuttavia, prima dell'impiego consultare il proprio Organismo di Controllo e Certificazione Bio.

CONFEZIONE

Bottiglia da 1L in cartone 12x1L

Contenuto netto: 1 L

DIOXI GROW

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Panelli

Azoto (N) organico	3%
--------------------	----

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: Panelli prodotti e sottoprodotti di origine vegetale.

CARATTERISTICHE

Dioxi Grow è un promotore del metabolismo per una maggiore qualità e resa delle colture. Il miglioramento dell'efficienza metabolico si traduce in una maggiore vigoria e produttività della pianta, aumentando al contempo la resistenza, le difese e riducendo lo stress. Provoca un aumento dell'assorbimento dei micronutrienti grazie ad un apporto supplementare di energia, aumentando a sua volta l'efficienza dei processi fisiologici della pianta, incrementandone le difese naturali e la resistenza alle malattie, alla siccità, al gelo, alla scarsa crescita delle radici, migliorando così i processi associati alla riproduzione e ad una maggiore radicazione. DIOXI GROW è ricco di aminoacidi pari al 25%.

DOSAGGIO E APPLICAZIONE

Può essere applicato a tutti i tipi di colture. Non superare le dosi consigliate, altrimenti effettuare un test di fitotossicità. Applicazione fogliare e radicale: 0,3-0,5 kg/ha, distribuiti in più applicazioni.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

DIOXI GROW è compatibile con la maggior parte dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari riconosciuti. In caso di dubbio, eseguire un test preliminare di compatibilità. Manipolare il prodotto secondo le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza. Utilizzare dispositivi di protezione individuale adeguati e lavarsi le mani dopo aver maneggiato il prodotto. Le caratteristiche del prodotto devono rimanere garantite con una durata di conservazione di due anni secondo le raccomandazioni di conservazione descritte dal produttore.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto nei contenitori originali. Tenere i contenitori chiusi quando non sono in uso. Evitare di esporre il prodotto alla luce diretta del sole. Conservare in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, radiazioni ed elettricità, a una temperatura compresa tra 5° e 35°C.

RESPONSABILITÀ

Il produttore garantisce la composizione, la formulazione e il contenuto del prodotto. L'utilizzatore è responsabile di eventuali danni causati dall'inosservanza totale o parziale delle istruzioni per l'uso del prodotto dichiarate in questo documento e/o riportate sull'etichetta del prodotto, nonché dell'uso improprio del prodotto al di fuori delle indicazioni dettagliate, in quanto il prodotto può essere soggetto a variazioni a causa delle condizioni di utilizzo, stoccaggio, contatto ambiente, manipolazione e/o lavorazione. AGROBIOLOGY CROP NUTRITION S.L.U. non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall'uso o dall'abuso dei suoi prodotti in condizioni particolari.

PRECAUZIONI

- P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P270 - Non mangiare, bere e fumare durante l'uso.
- P264 - Lavarsi accuratamente dopo la manipolazione.
- P261 - Evitare di respirare polvere/fumi/gas/nebbia/vapori/spray

CONFEZIONE

Sacchetto da 300 g
Peso netto: 300 g

CE DIOXI KIRA

CONCIME INORGANICO SEMPLICE A BASE DI MICROELEMENTI

Concime a base di microelementi chelati Zinco (Zn) EDTA

Tenore dichiarato di nutrienti in massa:

Zinco (Zn), idrosolubile	12,0%
Zinco (Zn), chelato con EDTA, idrosolubile	11,4%
Intervallo di pH che garantisce una stabilità accettabile della frazione chelata:	4 - 9

INGREDIENTI

Disodium zincate¹ (CAS n°14025-21-9)

¹CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo

ISTRUZIONI PER L'USO

Può essere applicato a tutti i tipi di colture.

Applicazione radicale: 1-2 Kg/ha.

Versare l'acqua nel serbatoio dell'irroratore (2/3 del suo volume), accendere il miscelatore, versare la quantità misurata del concime, aggiungere l'acqua nel serbatoio dell'irroratore. Irrorare di sera o durante le giornate nuvolose senza pioggia.

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

DIOXI KIRA è una miscela solida di zinco chelato ad alto contenuto di zinco per coprire le carenze nutritive. Grazie alla formula chelata acquisisce una elevata stabilità, mantenendo la disponibilità degli ioni nella soluzione del suolo e quindi migliorando l'assimilazione dei nutrienti nella pianta. Il loro apporto favorisce un aumento della crescita vegetativa e radice.

CONDIZIONI DI MAGAZZINAGGIO

Conservare il prodotto nei contenitori originali. Tenere i contenitori chiusi quando non vengono utilizzati. Evitare di esporre il prodotto direttamente al sole. Mantenere in luogo asciutto, fresco e ben ventilato, lontano da qualsiasi fonte di calore o radiazioni ed elettricità, ad una temperatura compresa tra 5°C e 35°C.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E SULL'AMBIENTE

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Indossare sempre i guanti protettivi. In caso di contatto con la pelle e occhi sciacquare con l'acqua. In caso di sversamento, eliminare a secco, successivamente lavare il luogo contaminato con l'acqua.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il produttore garantisce la composizione, la formulazione e il contenuto del prodotto. L'utente sarà responsabile dei danni causati dalla totale inosservanza e parte delle istruzioni del prodotto dichiarate in questa etichettatura, allo stesso modo per un uso improprio del prodotto al di fuori delle indicazioni dettagliate, in quanto il prodotto potrebbe subire variazioni dovute dalle condizioni di utilizzo, alla conservazione, al contatto, all'ambiente, alla manipolazione e/o sottoposto a processo. Agrobiology Crop Nutrition S.L.U. non accetta responsabilità per le conseguenze derivanti dall'uso o abuso dei propri prodotti in condizioni particolari.

Tutte le materie prime utilizzate per formulare questo prodotto sono elencate nell'allegato II del Reg. (UE) 2021/1165 che ne autorizza l'utilizzo nella produzione biologica. Tuttavia, prima dell'impiego consultare il proprio Organismo di Controllo e Certificazione Bio.

CONFEZIONE

Sacchetto da 1kg in cartone 20x1kg

Peso netto: 1kg

CE DIOXI MIRTO

CONCIME INORGANICO SEMPLICE A BASE DI MICROELEMENTI

Concime a base di microelementi chelati Manganese (Mn) EDTA

Tenore dichiarato di nutrienti in massa:

Manganese (Mn), idrosolubile	10%
Manganese (Mn), chelato con EDTA, idrosolubile	8%
Intervallo di pH che garantisce una stabilità accettabile della frazione chelata:	4 - 9

INGREDIENTI

Disodium manganate¹ (CAS n°15375-84-5)

¹CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo

ISTRUZIONI PER L'USO

Può essere applicato a tutti i tipi di colture.

Applicazione radicale: 1-2 Kg/ha.

Versare l'acqua nel serbatoio dell'irroratore (2/3 del suo volume), accendere il miscelatore, versare la quantità misurata del concime, aggiungere l'acqua nel serbatoio dell'irroratore. Irrorare di sera o durante le giornate nuvolose senza pioggia.

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

DIOXI MIRTO è una miscela solida di manganese chelato raccomandato per ridurre le carenze di manganese nella coltura. Il prodotto favorisce un aumento della crescita vegetativa e della radice.

CONDIZIONI DI MAGAZZINAGGIO

Conservare il prodotto nei contenitori originali. Tenere i contenitori chiusi quando non vengono utilizzati. Evitare di esporre il prodotto direttamente al sole. Conservare in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato, lontano da tutte le fonti di calore, radiazione ed elettricità, ad una temperatura compresa tra 5°C e 35°C.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E SULL'AMBIENTE

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Indossare sempre i guanti protettivi. In caso di contatto con la pelle e occhi sciacquare con l'acqua. In caso di sversamento, eliminare a secco, successivamente lavare il luogo contaminato con l'acqua.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il produttore garantisce la composizione, la formulazione e il contenuto del prodotto. L'utente sarà responsabile dei danni causati dalla totale inosservanza e parte delle istruzioni del prodotto dichiarate in questa etichettatura, allo stesso modo per un uso improprio del prodotto al di fuori delle indicazioni dettagliate, in quanto il prodotto potrebbe subire variazioni dovute dalle condizioni di utilizzo, alla conservazione, al contatto, all'ambiente, alla manipolazione e/o sottoposto a processo. Agrobiology Crop Nutrition S.L.U. non accetta responsabilità per le conseguenze derivanti dall'uso o abuso dei propri prodotti in condizioni particolari.

Tutte le materie prime utilizzate per formulare questo prodotto sono elencate nell'allegato II del Reg. (UE) 2021/1165 che ne autorizza l'utilizzo nella produzione biologica. Tuttavia, prima dell'impiego consultare il proprio Organismo di Controllo e Certificazione Bio.

CONFEZIONE

Sacchetto da 1kg in cartone 20x1kg

Peso netto: 1kg

CE DIOXI TALOS

CONCIME INORGANICO COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI

Manganese (Mn) HGA e Zinco (Zn) HGA

Tenore dichiarato di nutrienti in massa:

Manganese (Mn), idrosolubile	5%
Manganese (Mn), complessato con HGA, idrosolubile	4,5%
Zinco (Zn), idrosolubile	7%
Zinco (Zn), complessato con HGA, idrosolubile	6,5%

INGREDIENTI

Glucoeptonato di manganese (EC n°946-400-7); Glucoeptonato di zinco (EC n°946-329-1)

¹CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo

ISTRUZIONI PER L'USO

Può essere applicato a tutti i tipi di colture.

Applicazione radicale: 1-2 Kg/ha.

Versare l'acqua nel serbatoio dell'irroratore (2/3 del suo volume), accendere il miscelatore, versare la quantità misurata del concime, aggiungere l'acqua nel serbatoio dell'irroratore. Irrigare di sera o durante le giornate nuvolose senza pioggia.

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

DIOXI TALOS è una miscela solida di micronutrienti (zinco e manganese) complessati con acido eptagluconico, per coprire le carenze nutrizionali. La formula complessata permette un'alta stabilità, mantenendo la disponibilità di ioni in soluzione nel terreno, migliorando l'assimilazione dei nutrienti nella pianta. Il loro apporto favorisce un aumento della crescita vegetativa e radice.

CONDIZIONI DI MAGAZZINAGGIO

Conservare il prodotto nei contenitori originali. Tenere i contenitori chiusi quando non vengono utilizzati. Evitare di esporre il prodotto direttamente al sole. Mantenere in luogo asciutto, fresco e ben ventilato, lontano da qualsiasi fonte di calore o radiazioni ed elettricità, ad una temperatura compresa tra 5°C e 35°C.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E SULL'AMBIENTE

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Indossare sempre i guanti protettivi. In caso di contatto con la pelle e occhi sciacquare con l'acqua. In caso di sversamento, eliminare a secco, successivamente lavare il luogo contaminato con l'acqua.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il produttore garantisce la composizione, la formulazione e il contenuto del prodotto. L'utente sarà responsabile dei danni causati dalla totale inosservanza e parte delle istruzioni del prodotto dichiarate in questa etichettatura, allo stesso modo per un uso improprio del prodotto al di fuori delle indicazioni dettagliate, in quanto il prodotto potrebbe subire variazioni dovute dalle condizioni di utilizzo, alla conservazione, al contatto, all'ambiente, alla manipolazione e/o sottoposto a processo. Agrobiology Crop Nutrition S.L.U. non accetta responsabilità per le conseguenze derivanti dall'uso o abuso dei propri prodotti in condizioni particolari.

Tutte le materie prime utilizzate per formulare questo prodotto sono elencate nell'allegato II del Reg. (UE) 2021/1165 che ne autorizza l'utilizzo nella produzione biologica. Tuttavia, prima dell'impiego consultare il proprio Organismo di Controllo e Certificazione Bio.

CONFEZIONE

Sacchetto da 1kg in cartone 20x1kg

Peso netto: 1kg

CE DIOXI TSP

CONCIME INORGANICO SOLIDO SEMPLICE A BASE DI MACROELEMENTI

K (SO₃) 30 (28) con microelementi

Tenore dichiarato di nutrienti in massa:

Ossido di Potassio (K ₂ O), idrosolubile	30%
Anidride solforica (SO ₃), idrosolubile	28%
Ferro (Fe) chelato con EDTA, idrosolubile	1,7%
Manganese (Mn) chelato con EDTA, idrosolubile	1,4%
Zinco (Zn), chelato con EDTA, idrosolubile	1,8%
Intervallo di pH che garantisce una stabilità accettabile della frazione chelata:	4-9

A basso tenore di cloruro

Granulometria:

POLVERE: 90% del prodotto passa attraverso un setaccio di 1 mm.

INGREDIENTI

Solfato di potassio¹ (CAS n°7778-80-5); Ferro EDTA, sale sodico¹ (CAS n°15708-41-5); Manganese EDTA, sale sodico¹ (CAS n°15375-84-5); Zinco EDTA, sale sodico¹ (CAS n°14025-21-9)

¹CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo

ISTRUZIONI PER L'USO

Può essere applicato a tutti i tipi di colture.

Applicazione radicale: 1-2 Kg/ha

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

DIOXI TSP è una miscela solida ad alto contenuto di potassio accompagnata da microelementi (ferro, zinco e manganese) per coprire le carenze nutrizionali. È compatibile con la maggior parte dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari riconosciuti. In caso di dubbi effettuare preventivamente un test di compatibilità.

CONDIZIONI DI MAGAZZINAGGIO:

Conservare il prodotto nei contenitori originali. Tenere i contenitori chiusi quando non vengono utilizzati. Evitare di esporre il prodotto direttamente al sole. Conservare in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato, lontano da tutte le fonti di calore, radiazione ed elettricità, a una temperatura compresa tra 5°C e 35°C.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E SULL'AMBIENTE



Pericolo
H318 Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza:

P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un medico. Contiene Solfato di potassio

UFI: V300-E004-P00T-GJ04

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il produttore garantisce la composizione, la formulazione e il contenuto del prodotto. L'utente sarà responsabile dei danni causati dalla totale inosservanza e parte delle istruzioni del prodotto dichiarate in questa etichettatura, allo stesso modo per un uso improprio del prodotto al di fuori delle indicazioni dettagliate, in quanto il prodotto potrebbe subire variazioni dovute dalle condizioni di utilizzo, alla conservazione, al contatto, all'ambiente, alla manipolazione e/o sottoposto a processo.

Agrobiology Crop Nutrition S.L.U. non accetta responsabilità per le conseguenze derivanti dall'uso o abuso dei propri prodotti in condizioni particolari.

Tutte le materie prime utilizzate per formulare questo prodotto sono elencate nell'allegato II del Reg. (UE) 2021/1165 che ne autorizza l'utilizzo nella produzione biologica. Tuttavia, prima dell'impiego consultare il proprio Organismo di Controllo e Certificazione Bio.

CONFEZIONE

Sacchetto da 1kg in cartone 20x1kg

Sacchetto da 5kg in cartone 4x5kg

Peso netto: 1kg-5kg

CE ECKOSIL

CONCIME INORGANICO COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI

Ferro (Fe) solfato, Molibdeno (Mo) sodio, Zinco (Zn) EDTA

IN SOLUZIONE

Tenore dichiarato di nutrienti in massa:

Ferro (Fe) solfato, idrosolubile	1,2%
Molibdeno (Mo) sodio, idrosolubile	0,035%
Zinco (Zn) chelato con EDTA, idrosolubile	1%
Agente chelante: EDTA	
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata:	4-9

INGREDIENTI

Acido ortosilicico¹ (CAS n° 10193-36-9); Zinco disodico EDTA¹ (CAS n° 14025-21-9); Solfato di ferro¹ (CAS n° 7720-78-7); Molibdato di sodio¹ (CAS n° 10102-40-6)

¹CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo

USO E DOSI

Raccomandato per tutte le colture. Per orticole, vigneti, alberi da frutta con guscio e pomacee, agrumi, uliveti, cereali e riso.

La dose va da 200 a 400 ml/ha, in vari trattamenti. Si raccomanda la miscela con Brentax Ca. Controllare il pH della miscela finale e regolarlo tra 6 e 6,5 per risultati agronomici ottimali. Non superare la dose massima senza consulenza agronomica.

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

ECKOSIL mette a disposizione il silicio rafforzando l'assorbimento di ferro, zinco e molibdeno fornendo alla pianta 2 effetti: la regolazione dell'assorbimento dei nutrienti e la protezione meccanica contro le aggressioni esterne. ECKOSIL contenenti ferro, zinco e molibdeno sono in forma completamente biodisponibile. Il ferro, partecipa direttamente alla sintesi clorofilliana; lo zinco influenza direttamente la sintesi degli acidi nucleici e la formazione delle proteine, infine, il molibdeno partecipa al metabolismo dell'azoto.

Il prodotto contiene anche: Acido ortosilicico solubile in acqua 3%

CONDIZIONI DI MAGAZZINAGGIO

Conservare in luogo asciutto, al riparo dal freddo e dal caldo. Le temperature inferiori a 5°C e superiori a 28°C non sono raccomandate e sebbene non danneggino il prodotto, possono determinare un cambiamento del suo aspetto. Evitare situazioni di stoccaggio prolungato e l'esposizione alla luce solare.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E SULL'AMBIENTE



Attenzione

Indicazioni di pericolo:

H302 Nocivo se ingerito.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:

P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.

P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE: in presenza di malessere contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/... P330 Sciacquare la bocca.

P501 Smaltire il contenuto/recipiente in...

UFI: 7T69-VDH6-6M3C-RGWU

ALTRE INFORMAZIONI

Tutte le materie prime utilizzate per formulare questo prodotto sono elencate nell'allegato II del Reg. (UE) 2021/1165 che ne autorizza l'utilizzo nella produzione biologica. Tuttavia, prima dell'impiego consultare il proprio Organismo di Controllo e Certificazione Bio.

CONFEZIONE

Bottiglia da 1L in cartone 12x1L

Tanica da 5L in cartone 4x5L

Contenuto netto: 1L-5L

ETA-BOR

CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI

Boro etanolammina

Boro (B) solubile in acqua	11%
----------------------------	-----

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: Boro etanolammina.

CARATTERISTICHE

Eta-Bor previene e corregge la carenza di boro. Il complesso boro etanolammina facilita l'assimilazione per la pianta e facilita il trasporto degli zuccheri attraverso le membrane, stimola l'accrescimento dei meristemi apicali, favorisce l'allegagione. È ideale nell'applicazione preventiva, visto che i sintomi di carenza di boro si manifestano in ritardo.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

ETA-BOR si utilizza nei trattamenti fogliari e radicali secondo il seguente schema:

- Trattamenti fogliari delle floricole e ornamentali: 300g/100 litri.
- Trattamenti radicali: in fase preventiva 1,5-2kg/ettaro; quando si osservano i sintomi di carenza 4-5kg/ettaro.

COMPATIBILITÀ

È un prodotto che non presenta controindicazioni, pur tuttavia, vista la grande quantità di specie e varietà coltivate, è bene eseguire piccoli saggi di fitotossicità preliminari. Si raccomanda di consultare il nostro Ufficio Tecnico per qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato.

AVVERTENZE

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 25°C. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

CONFEZIONE

Bottiglia da 1kg in cartone 12x1kg

Tanica da 7kg in cartone 4x7kg

Peso netto: 1,35kg=1L

FEUCARPOS

CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI

Chelato di ferro (Fe) EDDHSA

Ferro (Fe) solubile in acqua	6%
Ferro (Fe) chelato con EDDHSA	6%
Agente chelante: EDDHSA	
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata:	2-11

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: chelato di ferro (EDDHSA)

CARATTERISTICHE

Feucarpos è un formulato contenente ferro chelato con EDDHSA consigliato per la prevenzione e la cura delle alterazioni fisiologiche dovute a carenza o insufficiente disponibilità di ferro da parte delle piante. La pronta e completa solubilità in acqua, l'alta bagnabilità e la rapidità d'azione di Feucarpos consentono il controllo e la cura della clorosi ferrica. La clorosi ferrica, che si manifesta con ingiallimento internervale delle foglie e scarso sviluppo dei germogli, è dovuta più spesso ad una carenza relativa del ferro, nel senso che il ferro può essere presente nel terreno ma non in una forma disponibile per la pianta.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

FEUCARPOS si utilizza nei trattamenti fogliari e radicali secondo il seguente schema:

- Trattamenti fogliari: 150 g/100 litri sia per le colture arboree che erbacee.
- Trattamenti radicali: 5-10 kg/ettaro su tutte le colture, secondo necessità.

Si consiglia di iniziare i trattamenti alla fine del riposo vegetativo.

COMPATIBILITÀ

È un prodotto che non presenta controindicazioni, pur tuttavia, vista la grande quantità di specie e varietà coltivate, è bene eseguire piccoli saggi di fitotossicità preliminari. Si raccomanda di consultare il nostro Ufficio Tecnico per qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato.

AVVERTENZE

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

CONFEZIONE

Sacchetto da 5kg

Peso netto: 5kg

CE KIPLANT ESSENCE

CONCIME INORGANICO COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI

Boro (B) etanolamina, Molibdeno (Mo) sodio

IN SOLUZIONE

Tenore dichiarato di nutrienti in massa:

Boro (B) etanolamina, idrosolubile	2%
Molibdeno (Mo) sodio, idrosolubile	0,02%

INGREDIENTI

Boro etanolamina¹ (CAS n° 26038-87-9)

¹CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo

USO E DOSI:

Kiplant Essence è utilizzabile nella maggior parte delle colture, soprattutto orticole. La normale dose di applicazione è di 200-300 ml / hl per correggere carenze di boro. Se applicato in una miscela con insetticidi e fungicidi, la dose è 150 ml / hl. La quantità di soluzione applicata deve essere sufficiente a garantire una buona copertura dell'intera pianta. In caso di miscelazione con altri prodotti, è consigliabile eseguire dei saggi preliminari.

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Kiplant Essence è un correttore di carenza di boro che grazie alla sua speciale formulazione migliora l'uniformità di distribuzione e aderenza dei trattamenti fogliari, aumentando l'efficacia di altri prodotti usati in combinazione.

CONDIZIONI DI MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a temperatura e pressione ordinaria. Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 40°C.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E SULL'AMBIENTE

P102: tenere fuori dalla portata dei bambini. P270: non mangiare né bere, né fumare durante l'uso. Conservare lontano dagli alimenti, bevande e mangimi per gli animali. In caso di contatto con gli occhi sciacquare accuratamente, contattare un medico. In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare la doccia. Indossare indumenti protettivi, guanti e lenti. In caso di incidente o di malessere, consultare immediatamente un medico (se è possibile mostrare l'etichetta).

ALTRE INFORMAZIONI:

Tutte le materie prime utilizzate per formulare questo prodotto sono elencate nell'allegato II del Reg. (UE) 2021/1165 che ne autorizza l'utilizzo nella produzione biologica. Tuttavia, prima dell'impiego consultare il proprio Organismo di Controllo e Certificazione Bio.

CONFEZIONE

Bottiglia da 1L in cartone 12x1L

Tanica da 5L in cartone 4x5L

Contenuto netto: 1L-5L

LIFECOMPOST

AMMENDANTE

Vermicompost da letame bovino

Azoto (N) organico sul secco	1,9%
Azoto (N) totale sul secco	2,4%
Carbonio (C) organico di origine biologica sul secco	35%
Rapporto C/N	14,5
Sostanza organica sul secco	70%
Sostanza organica estraibile in percentuale sulla sostanza organica	62%
Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica estraibile	93%
pH	8

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: letame bovino non proveniente da allevamenti industriali.

CARATTERISTICHE

Lifecompost è un ammendante che si ottiene dalla decomposizione dei residui organici provenienti esclusivamente da letame bufalino grazie all'azione dei lombrichi. È un vermicompost ricco di elementi nutritivi facilmente assimilabili dalle piante. Inoltre, la sua presenza nel suolo migliora la struttura del terreno. Si presenta come un terriccio ed è inodore.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

LIFECOMPOST si utilizza alla dose di 500g/mq mescolandolo con il terreno. In orticoltura è opportuno l'utilizzo del vermicompost in fase di trapianto localizzandolo nei solchi. Si può comunque ripetere la concimazione nella fase di crescita delle piante. In frutticoltura, nella fase di preparazione del terreno è opportuno fornire 1kg/pianta, ripetendo poi gli interventi di concimazione durante la crescita delle piante. In floricoltura, utilizzare 200 g/pianta di vermicompost, ripetendo l'operazione periodicamente.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati, purtuttavia è sempre consigliato effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

AVVERTENZE

Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

CONFEZIONE

Sacco da 20kg

Peso netto: 20kg

CE LIFEN**CONCIME ORGANICO LIQUIDO****K₂O 2 +30 C****Tenore dichiarato di nutrienti in massa:**

Ossido di potassio (K ₂ O) totale	2%
Carbonio organico (C org)	30%
Sostanza secca	61%
Rapporto C org/N	n.a.

INGREDIENTIEstratto di *Ascophyllum nodosum*¹ (CAS n° 84775-78-0)¹CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo**USO E DOSI**

Dose generale pre-semina/trapianto: 10,0 -15,0 L/ha

Dose generale post-semina/trapianto: 1,5 -5,0 L/ha

Per uso pre-semina/trapianto minimo 15 giorni prima, seguendo i passaggi seguenti:

- 1) Preparazione del terreno per ottenere un letto di semina pulito e finemente sminuzzato.
 - 2) Irrigazione abbondante fino alla capacità di campo.
 - 3) Applicazione del prodotto mediante fertirrigazione, aspersione o micro-aspersione.
 - 4) Successiva leggera irrigazione per facilitare la discesa del prodotto verso l'area di sviluppo radicale.
- Adatto a tutte le colture, adattando il dosaggio indicato alla tessitura del terreno e alla coltura.

CONDIZIONI DI MAGAZZINAGGIO:

Non applicare durante le ore più calde. Non è consigliabile da utilizzare in condizioni meteorologiche mutevoli, come la possibilità di gelo o temperature elevate. Il prodotto, con il tempo, può evidenziare una separazione della frazione organica, ciò non altera la composizione o le proprietà. Si consiglia sempre di effettuare test di compatibilità preliminari sulle colture su un numero minimo di piante. Attendere i giorni necessari per verificare i risultati di compatibilità prima di trattare. Non lasciare mai il contenitore incustodito. Si consiglia di conservare il prodotto ben chiuso ed in luogo fresco a temperatura compresa tra 5°C e 35°C. A basse temperature possono verificarsi fenomeni di cristallizzazione che possono essere eliminati grazie all'aumento della temperatura di conservazione. Agitare bene prima dell'uso.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E SULL'AMBIENTE

Al fine di evitare rischi per le persone e per l'ambiente, seguire le istruzioni consigliate per l'uso di questo prodotto fertilizzante. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

Tutte le materie prime utilizzate per formulare questo prodotto sono elencate nell'allegato II del Reg. (UE) 2021/1165 che ne autorizza l'utilizzo nella produzione biologica. Tuttavia, prima dell'impiego consultare il proprio Organismo di Controllo e Certificazione Bio.

CONFEZIONE

Tanica da 5L in cartone 4x5L

Contenuto netto: 5L

LIFESTRONG 1

CONCIME ORGANICO AZOTATO

Borlanda essiccata

Azoto (N) organico	3%
Ossido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua	10%
Carbonio (C) organico	20%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: Borlanda essiccata da melasso di barbabietola non estratta con sali ammoniacali.

CARATTERISTICHE

Lifstrong 1 è un prodotto ottenuto da materie prime non trattate chimicamente; è una fonte di potassio "bio" prontamente assimilabile dalle piante. Grazie alla sua origine agisce sulla microflora stimolandone fortemente la moltiplicazione. Dato per via fogliare costituisce un buon prodotto per integrare potassio in caso di avvertita necessità.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

LIFESTRONG 1 si utilizza nei trattamenti fogliari e radicali secondo il seguente schema:

- Trattamenti fogliari: 100 -200g/100 litri.
- Trattamenti radicali: 0,5-1kg/1000 metri quadri.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto, dato per via fogliare, non va miscelato con sostanze a reazione molto alcalina né con zolfo e/o rame né con prodotti che contengono zolfo e/o rame. È un prodotto naturale e non presenta controindicazioni, pur tuttavia, vista la grande quantità di specie e varietà coltivate, è bene eseguire piccoli saggi di fitotossicità preliminari. Si raccomanda di consultare il nostro Ufficio Tecnico per qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri.

CONFEZIONE

Sacchetto da 1kg in cartone 15x1kg

Peso netto: 1kg

MAXX ORGANIC

CONCIME ORGANICO AZOTATO

Borlanda agroalimentare fluida di frutta e cereali

Azoto (N) organico	2%
Carbonio (C) organico	20,5%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: borlanda agroalimentare fluida di frutta e cereali non estratta con sali ammoniacali.

CARATTERISTICHE

Maxx Organic attiva la flora microbica autoctona, favorisce lo sviluppo del sistema radicale ed apporta un alto contenuto nutrizionale. Il suo utilizzo frequente migliora la struttura del suolo e lo scambio cationico. Impedisce la retrogradazione del fosforo e potassio. Contribuisce alla formazione di umati e umofosfati che fissano i nutrienti forniti, riducendo le perdite per percolazione.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

MAXX ORGANIC si utilizza sia nei trattamenti fogliari che radicali secondo il seguente schema:

-Trattamenti fogliari: 3-4 applicazioni da 150-250 cc/100 litri fino a 45-50 litri/ettaro.

-Trattamenti radicali: 2-3 applicazioni da 30-40 litri/ettaro, fino a 60-120 litri/ettaro.

Ortaggi: 60-90 litri/ettaro.

Fragola: 60-90 litri/ettaro.

Arboree: 22-35 litri/ettaro.

Agrumi: 45-60 litri/ettaro in estate ai primi getti vegetativi, in pre-fioritura e all'ingrossamento dei frutti.

Vite: 30-60 litri/ettaro prima della ripresa vegetativa, prima e dopo la fioritura, inizio maturazione.

Ornamentali: 75-90 litri/ettaro.

Tappeti erbosi: 150-180 litri/ettaro.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati, si consiglia comunque di effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

AVVERTENZE

Conservare il prodotto a temperature comprese tra 5°C e 30°C. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

CONFEZIONE

Tanica da 5L-20L

Cisternetta IBC da 1000L

Peso netto: 1,18kg=1L

ORMOSTING

CONCIME ORGANICO AZOTATO

Estratto fluido di lievito contenente alghe brune

Azoto (N) organico	1,5%
Carbonio (C) organico	10%
Sostanza organica con peso molecolare nominale <50 kDa	30%
pH	5,5

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: Prodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione e prodotto a base di alghe ottenuto direttamente mediante estrazione acquosa derivante solo da produzione biologica o sostenibile conformemente all'allegato II, parte III, punto 2.4 del Reg. (UE) 2018/848.

CARATTERISTICHE

Grazie al suo contenuto di L-aminoacidi, il prodotto stimola i processi naturali di crescita della pianta favorendo la sintesi proteica e l'accumulo di vitamine. Aumenta il contenuto di prolina (aminoacido naturale) e aiuta le piante nei momenti di stress favorendo l'assorbimento di calcio nei punti di crescita.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

ORMOSTING si utilizza nei trattamenti fogliari secondo le seguenti dosi:

- Ortaggi e fragola: 60-80 cc/litro dalla fioritura ogni 15-20 giorni associato a QUANTICO.
- Ornamentali: 100 cc/100 litri.
- Fruttiferi: 50-80 cc/100 litri facendo 3-4 trattamenti a partire dalla pre-fioritura.

COMPATIBILITÀ

Visto l'alto numero di specie e varietà, si consiglia di eseguire sempre saggi preliminari sia per la valutazione delle miscele che del prodotto. Evitare miscele con zolfo e rame e con prodotti che contengono zolfo e rame.

AVVERTENZE

Conservare a temperature comprese tra 4°C e 30°C. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. **Agitare bene il prodotto prima dell'uso.**

CONFEZIONE

Bottiglia da 1L in cartone 16x1L

Peso netto: 1,12kg=1L

SUPER MAXX

CONCIME ORGANICO AZOTATO

Borlanda fluida

Azoto (N) organico	3%
Ossido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua	5%
Carbonio (C) organico	15%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: Borlanda fluida da melasso di barbabietola non estratta con sali ammoniacali.

CARATTERISTICHE

Super Maxx attiva la flora microbica autoctona e favorisce lo sviluppo del sistema radicale apportando un alto contenuto nutrizionale. Il suo utilizzo migliora la struttura del suolo e lo scambio cationico e impedisce la retrogradazione del fosforo e del potassio contribuendo alla formazione di umati e umofosfati che fissano i nutrienti forniti, riducendo le perdite per percolazione.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

SUPER MAXX si utilizza nei trattamenti fogliari e radicali secondo il seguente schema:

- Trattamenti fogliari: 3- 4 applicazioni da 150-250cc/100 litri fino a 45-50litri/ettaro
- Trattamenti radicali: 2-3 applicazioni da 30 - 40litri/ettaro fino a 60-120litri/ettaro

Ortaggi: 60-90litri/ettaro

Fragola: 60-90litri/ettaro

Arboree: 22-35litri/ettaro

Agumi: 45-60litri/ettaro in estate ai primi getti vegetativi, in pre-fioritura e all'ingrossamento dei frutti

Vite: 30-60 litri/ettaro prima della ripresa vegetativa, prima e dopo la fioritura, inizio maturazione

Ornamentali: 75-90litri/ettaro

Tappeti erbosi: 150-180litri/ettaro

COMPATIBILITÀ

Può essere miscelato con chelati di ferro. Non mescolarlo con prodotti che contengono fosfati e che producono reazioni alcaline.

AVVERTENZE

Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Conservare a temperature comprese tra 4°C e 32°C. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

CONFEZIONE

Bottiglia da 1L in cartone 12x1L

Tanica da 5L in cartone 4x5L

Tanica da 10L

Cisternetta IBC da 1000L

Peso netto: 1,28 kg=1L

UMICO

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

Umati solubili da leonardite

Carbonio (C) organico solubile in acqua	12,8%
Carbonio (C) organico umificato	12,2%
Azoto (N) organico sulla sostanza secca	0,9%
Mezzo estraente: KOH	

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: estratti umici senza aggiunta di sostanze fenoliche ed estratti con Sali di natura inorganica non ammoniacali.

CARATTERISTICHE

Umico è un prodotto a base di acidi umici e fulvici che sono i principali costituenti della materia organica in avanzato stato di decomposizione. UMICO aumenta la capacità di scambio cationico e la fertilità del suolo. Costituisce una riserva di nutrienti per le piante. Forma aggregati stabili con cui migliora la struttura del suolo. Stimola la crescita delle colonie di microrganismi che agiscono nella decomposizione dei residui della raccolta. Migliora le caratteristiche dei terreni sodici, permettendo una maggiore penetrazione dell'acqua e migliorandone la struttura. UMICO migliora le caratteristiche fisico-chimiche del suolo e favorisce la vita microbica, aiutando la pianta a sviluppare un buon apparato radicale ed a disporre di più nutrienti in forma assimilabile. Favorisce lo sblocco di potassio e fosforo poco assimilabili nel suolo, promuovendone l'assimilazione e prolungando l'efficacia delle concimazioni.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Può essere applicato a qualsiasi coltura sia per via fogliare che radicale:

- Trattamenti fogliari: 100-200 cc/100litri (1-2 litri/ettaro).
- Trattamenti radicali: 40-60 litri/ettaro suddivisi in più applicazioni durante la coltura.

COMPATIBILITÀ

Si può miscelare con chelati di ferro. Non miscelare con nitrato di calcio. Vista la grande quantità di specie e varietà coltivate, è bene eseguire piccoli saggi di fitotossicità preliminari. Si raccomanda di consultare il nostro ufficio tecnico per qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato.

AVVERTENZE

Conservare il prodotto a temperature comprese tra 4°C e 30°C. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

CONFEZIONE

Tanica da 5L in cartone 4x5L
Tanica da 20L

Peso netto: 1,18kg=1L

VERDEMAS

CONCIME ORGANICO AZOTATO

Estratto fluido di lievito contenente alghe brune
N 3 + 10 C

Azoto (N) organico	3%
Carbonio (C) organico	10%
pH	7,2
Sostanza organica con peso molecolare nominale <50KDa	30%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: prodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione e prodotto a base di alghe ottenuto direttamente mediante estrazione alcalina, derivante solo da produzione biologica o sostenibile conformemente all'allegato II, parte III, punto 2.4 del Reg. (UE) 2018/848.

CARATTERISTICHE

Verdemas contiene alghe appartenenti alla specie *Ascophyllum nodosum* ricche di betadine, di agenti che aiutano il trasporto dei nutrienti, di citochinine (precursori e stimolatori della produzione di fitormoni), di polisaccaridi che possono aumentare la resistenza alle avversità, nonché di aminoacidi. Il suo utilizzo migliora la resistenza della pianta agli stress, soprattutto agli sbalzi di temperatura e al forte caldo. Aumenta il potenziale osmotico, favorendo l'accumulo di acqua. Stimola e rende più vigorosa la pianta; aumenta il contenuto di fitoalessine. Favorisce lo sviluppo della microflora nel suolo aumentando la disponibilità di nutrienti; aumenta l'assimilazione di azoto e dei complessi fosfato-umati.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

VERDEMAS si utilizza nei trattamenti fogliari e radicali secondo il seguente schema:

- Trattamenti fogliari: 150 -250 cc/100 litri
- Trattamenti radicali: 3-7 litri/ettaro

COMPATIBILITÀ

È un prodotto naturale e non presenta controindicazioni, pur tuttavia, vista la grande quantità di specie e varietà coltivate, è bene eseguire piccoli saggi di fitotossicità preliminari. Si raccomanda di consultare il nostro Ufficio Tecnico per qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato.

AVVERTENZE

Il prodotto deve essere manipolato e stoccato a temperature comprese tra 5 e 32°C. In caso di fuoriuscita, raccogliere con segatura e/o sabbia.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

CONFEZIONE

Bottiglia da 1L in cartone 12x1L
Tanica da 5L in cartone 4x5L
Tanica da 10L

Peso netto: 1,2 kg=1L

GEL DI SILICE

CORROBORANTE

Potenziatore delle difese delle piante. Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici ed abiotici.

PUO' ESSERE UTILIZZATO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

GEL DI SILICE

Composizione: 98% Gel di Silice ottenuto dal trattamento fisico di silicati amorfi, sabbia di quarzo, terre diatomacee e similari.

CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso non riconducibile alla definizione di prodotto fitosanitario di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55. Il gel di silice è micronizzato ed ha capacità antiagglomeranti e fluidificanti. La grandezza delle particelle è garantita tra i 7 e i 9 µm. È un prodotto naturale, ecologico al 100% e non fitotossico. Gel di silice ha un alto potere assorbente di fluidi: 1000 g di prodotto sono capaci di assorbire 2900 ml di acqua. La sua applicazione riduce drasticamente l'umidità dell'ambiente e aiuta quindi a prevenire le patologie favorite dall'umidità. Distribuito nell'ambiente di coltivazione, grazie al suo alto potere igroscopico, protegge la pianta eliminando gli eccessi di umidità sia a livello fogliare che ambientale.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

GEL DI SILICE si utilizza nei trattamenti fogliari diluendolo in acqua alle seguenti dosi:

MODALITA' DI IMPIEGO	COLTURA	APPLICAZIONE	DOSE
FOGLIARE	Frutticole, Orticole, Ornamentali, Aromatiche, Uva da tavola e da mosto	ogni 10-15 gg in funzione delle esigenze colturali e dell'andamento climatico	50-250 g/hl
			1-2,5 kg/ha

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati, pur tuttavia è sempre consigliato effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

Prodotto non classificato ai sensi del Reg. (CE) 1272/2008 s.m.i. (CLP)

Il GEL DI SILICE non ha le caratteristiche né di un fertilizzante né di un fitosanitario ed è soggetto al codice del consumo Dlgs 206/2005 s.m.i. laddove applicabile.

Prodotto non soggetto ad autorizzazione presso il Ministero della Salute ai sensi del DPR 28/02/2012 n. 55.

AVVERTENZE

Conservare in luogo fresco e asciutto. Usare nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) e del Foglio Informativo. Evitare il contatto con pelle e occhi. Lavare le mani/parti esposte prima di mangiare, bere o fumare e a fine lavoro. Non respirare vapori/aerosol. Indossare guanti in gomma e indumenti protettivi; se si generano aerosol in locali chiusi o per esposizioni prolungate, usare mascherina idonea.

CONFEZIONE

Busta da 1kg in cartone 4x1kg

Busta da 5kg in cartone 1x5kg

Peso netto: 1kg-5kg

CHITO-IDEA

SOSTANZA DI BASE

Chitosano cloridrato (2,0%)

Approvazione della sostanza di base (CAS n.70694-72-3) ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014 della commissione del 23 maggio 2014.

Purezza: Farmacopea Europea, metalli pesanti ≤ 40 ppm.

DISPOSIZIONI D'USO

Generalmente utilizzato negli alimenti, tuttavia sono autorizzati gli usi come **Sostanza di Base** con funzione di induttore di risposte di autodifesa delle piante nei confronti di funghi e batteri patogeni (**elicitore con effetti fungicidi e battericidi**).

MODALITÀ D'USO

Per impiego in sospensione acquosa (adacquamento con 200-400 l/ha) e per trattamento ai semi (bagnamento/immersione).

Coltura	Epoca	N° (min/max) applicazioni	Intervallo minimo	Dosaggio (cc) in 10 litri di acqua	Dosaggio (litri) a ettaro (min/max)
Bacche e piccola frutta (uva, fragole, more, mirtilli, ribes, ecc.)	Dalla comparsa della prima foglia sino allo sviluppo del frutto	4-8	2 settimane	250-1000	5-40
Ortaggi, Cereali, Spezie e Foraggiere	Dalla comparsa della prima foglia sino allo sviluppo del frutto	4-8	2 settimane	250-500	5-20
Piante ornamentali bulbose	Dalla comparsa della prima foglia sino a fine ciclo	1-8	5/7 giorni	250-1000	5-40
Bietola	Dalla comparsa della prima foglia sino a fine ciclo	1-8	5/7 giorni	250-1000	5-40
Trattamento spray al seme (Cereali e Patata)	Prima della semina	1	-	250-500	-
Trattamento spray al seme (Barbabietola da zucchero)	Prima della semina	1	-	250-1000	-
Trattamento per immersione del bulbo di piante ornamentali	Prima dell'interramento	1	-	250-1000	-

Prodotto previsto dall'allegato I parte 1 del Reg. (UE) 2021/1165 che ne autorizza l'utilizzo nelle produzioni agricole biologiche.

Autorizzazione per l'immissione sul mercato non richiesta ai sensi dell'art. 28 del Reg. CE 1107/2009. Il prodotto non ha intervallo di carenza.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

CONFEZIONE

Bottiglia da 1L in cartone 12x1L

Tanica da 5L in cartone 4x5L

Peso netto: 1L-5L

DIOXI HOMERO

SOSTANZA DI BASE

ESTRATTO DI ORTICA *Urtica Spp.*

Approvazione della sostanza di base ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/419 della commissione del 9 Marzo 2017.

Purezza: Farmacopea Europea.

DISPOSIZIONI D'USO

Generalmente è impiegato nell'industria alimentare (nutraceutica) è altresì previsto l'uso come Sostanza di Base con funzione fungicida, insetticida ed acaricida.

CARATTERISTICHE

Si tratta di un macerato liquido da **diluire in ragione di 2 g/l di acqua** ed utilizzare secondo le modalità indicate in tabella:

Coltivazioni	Patologie	N° applicazioni (min/max)	Intervallo tra le applicazioni
- Alberi da frutto: melo, susino, pesco e ciliegio - Ribes rosso - Sambuco - Fagiolo, patata - Lattuga, cavolo - Rosa, spirea	Afidi	1-5	7-15 gg
Cavolo, colza, ravanello	Altica e Tignola	1-6	
Ravanello, senape	Alternaria		
Cetriolo	Alternaria, Mal bianco		
Alberi da frutto: melo, susino, pesco e ciliegio	Alternaria, Botrite, Monilia		
Vite, patata	Peronospora		
Melo, pero	Carpocapsa	3	15 gg
Fagiolo, vite	Ragnetto rosso	1-6	7-21 gg

Vista la natura del prodotto è possibile che si formi del sedimento, è sufficiente agitare prima dell'uso per risolvere il problema.

Modalità d'uso: spruzzare sulla parte epigea della pianta nelle ore più fresche della giornata ad una distanza di circa 50 cm, compresa la parte inferiore delle foglie. Epoca di impiego: primavera ed estate, fino alla maturazione. **Attendere almeno 7 giorni dopo l'ultima applicazione prima di raccogliere.**

Prodotto previsto dall'allegato I, parte 1, del Reg. (UE) 2021/1165 che ne autorizza l'utilizzo nella produzione biologica.

Autorizzazione per l'immissione sul mercato non richiesta ai sensi dell'art. 28 del Reg. CE 1107/2009. **Agitare bene il prodotto prima dell'uso.**

CONFEZIONE

Bottiglia da 1L in cartone 12x1L

Tanica da 5L in cartone 4x5L

Contenuto netto: 1L-5L

DIOXI NEMATIX

SOSTANZA DI BASE

ESTRATTO DI ORTICA *Urtica Spp.*

Approvazione della sostanza di base ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/419 della commissione del 9 Marzo 2017.

Purezza: Farmacopea Europea.

DISPOSIZIONI D'USO

Generalmente è impiegato nell'industria alimentare (nutraceutica) è altresì previsto l'uso come Sostanza di Base con funzione fungicida, insetticida ed acaricida.

CARATTERISTICHE

Si tratta di un macerato liquido da **diluire in ragione di 0,75/1 g/l di acqua** ed utilizzare secondo le modalità indicate in tabella:

Coltivazioni	Patologie	N° applicazioni (min/max)	Intervallo tra le applicazioni
- Alberi da frutto: melo, susino, pesco e ciliegio - Ribes rosso - Sambuco - Fagiolo, patata - Lattuga, cavolo - Rosa, spirea	Afidi	1-5	7-15 gg
Cavolo, colza, ravanello	Altica e Tignola	1-6	
Ravanello, senape	Alternaria		
Cetriolo	Alternaria, Mal bianco		
Alberi da frutto: melo, susino, pesco e ciliegio	Alternaria, Botrite, Monilia		
Vite, patata	Peronospora		
Melo, pero	Carpocapsa	3	15 gg
Fagiolo, vite	Ragnetto rosso	1-6	7-21 gg

Vista la natura del prodotto è possibile che si formi del sedimento, è sufficiente agitare prima dell'uso per risolvere il problema.

Modalità d'uso: spruzzare sulla parte epigea della pianta nelle ore più fresche della giornata ad una distanza di circa 50 cm, compresa la parte inferiore delle foglie. Epoca di impiego: primavera ed estate, fino alla maturazione. **Attendere almeno 7 giorni dopo l'ultima applicazione prima di raccogliere.**

Prodotto previsto dall'allegato I, parte 1, del Reg. (UE) 2021/1165 che ne autorizza l'utilizzo nella produzione biologica.

Autorizzazione per l'immissione sul mercato non richiesta ai sensi dell'art. 28 del Reg. CE 1107/2009. **Agitare bene il prodotto prima dell'uso.**

CONFEZIONE

Bottiglia da 1L in cartone 12x1L

Tanica da 5L in cartone 4x5L

Contenuto netto: 1L-5L

DIOXI OIL

SOSTANZA DI BASE

OLIO DI GIRASOLE

Approvazione della sostanza di base ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1978 della commissione del 11 Novembre 2016.

Purezza: Farmacopea Europea.

Acido Oleico 14-29%

Acido Linoleico 48-52%

DISPOSIZIONI D'USO

E' generalmente impiegato nell'industria alimentare è altresì previsto l'uso come Sostanza di Base con funzione fungicida.

CARATTERISTICHE

L'olio di girasole è di origine naturale ed ha azione fungicida, in particolare sui funghi come l'oidio ed è da utilizzare secondo le modalità indicate in tabella:

Coltivazioni	Patologie	N° applicazioni (min/max)	Intervallo tra le applicazioni	Dosaggio per trattamento (ml/10L d'acqua) (min-max)	Dosaggio L/ha con 5/10 hl acqua ad ettaro
Pomodoro (Lycopersicum, Esculentum)	Oidio (Oidium Neolycopersici)	2-4	8 gg	10-50	1-20

MODALITÀ D'USO

Applicazione fogliare, prima, durante le fasi di getti apicali e poi, durante la fioritura e comunque quando il rischio di attacchi di oidio è maggiore.

Attendere almeno 2 giorni dopo l'ultima applicazione prima di raccogliere.

Prodotto previsto dall'allegato I, parte 1, del Reg. (UE) 2021/1165 che ne autorizza l'utilizzo nelle produzioni agricole biologiche dell'Olio di girasole CAS n. 8001-21-6.

Autorizzazione per l'immissione sul mercato non richiesta ai sensi dell'art. 28 del Reg. CE 1107/2009.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

CONFEZIONE

Bottiglia da 1L in cartone 12x1L

Tanica da 5L in cartone 4x5L

Contenuto netto: 1L-5L

DIOXI PIRAÑA

SOSTANZA DI BASE

Chitosano cloridrato (5,0%)

Approvazione della sostanza di base ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014 della commissione del 23 maggio 2014.

Purezza: Farmacopea Europea, metalli pesanti ≤ 40 ppm.

DISPOSIZIONI D'USO

Generalmente utilizzato in medicina, negli alimenti, in cosmetica tuttavia sono autorizzati gli usi come **Sostanza di Base** con funzione di induttore di risposte di autodifesa delle piante nei confronti di funghi e batteri patogeni (**elicitor con effetti fungicidi e battericidi**).

MODALITÀ D'USO

Per impiego in sospensione acquosa (adacquamento con 200-400 l/ha) e per trattamento ai semi (bagnamento/immersione).

Coltura	Epoca	N° (min/max) applicazioni	Intervallo minimo	Dosaggio (cc) in 10 litri di acqua	Dosaggio (litri) a ettaro (min/max)
Bacche e piccola frutta (uva, fragole, more, mirtilli, ribes, ecc.)	Dalla comparsa della prima foglia sino allo sviluppo del frutto	4-8	2 settimane	100-400	2-16
Vite				100-200	2-8
Arboree				100-200	2-8
Ortaggi, Cereali, Spezie e Foraggiere				100-200	2-8
Piante ornamentali bulbose	Dalla comparsa della prima foglia sino a fine ciclo	1-8	5/7 giorni	100-400	2-16
Bietola	Dalla comparsa della prima foglia sino a fine ciclo	1-8	5/7 giorni	100-400	2-16
Trattamento spray al seme (Cereali e Patata)	Prima della semina	1	-	200-400	-
Trattamento spray al seme (Barbabietola da zucchero)	Prima della semina	1	-	200-800	-
Trattamento per immersione del bulbo di piante ornamentali	Prima dell'interramento	1	-	200-800	-

Prodotto previsto dall'allegato I parte 1 del Reg. (UE) 2021/1165 che ne autorizza l'utilizzo nelle produzioni agricole biologiche del Chitosano cloridrato CAS n. 70694-72-3.

Autorizzazione per l'immissione sul mercato non richiesta ai sensi dell'art. 28 del Reg. CE 1107/2009. Il prodotto non ha intervallo di carenza.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

CONFEZIONE

Bottiglia da 1L in cartone 12x1L

Tanica da 5L in cartone 4x5L

Contenuto netto: 1L-5L

DIOXI SOLDIER

SOSTANZA DI BASE

ESTRATTO DI ORTICA *Urtica Spp.*

Approvazione della sostanza di base ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/419 della commissione del 9 Marzo 2017.

Purezza: Farmacopea Europea.

DISPOSIZIONI D'USO

Generalmente è impiegato nell'industria alimentare (nutraceutica) è altresì previsto l'uso come Sostanza di Base con funzione fungicida, insetticida ed acaricida.

CARATTERISTICHE

Si tratta di un macerato liquido da **diluire in ragione di 0,75/1 g/l di acqua** ed utilizzare secondo le modalità indicate in tabella:

Coltivazioni	Patologie	N° applicazioni (min/max)	Intervallo tra le applicazioni
- Alberi da frutto: melo, susino, pesco e ciliegio - Ribes rosso - Sambuco - Fagiolo, patata - Lattuga, cavolo - Rosa, spirea	Afidi	1-5	7-15 gg
Cavolo, colza, ravanella	Altica e Tignola	1-6	
Ravanella, senape	Alternaria		
Cetriolo	Alternaria, Mal bianco		
Alberi da frutto: melo, susino, pesco e ciliegio	Alternaria, Botrite, Monilia		
Vite, patata	Peronospora		
Melo, pero	Carpocapsa	3	15 gg
Fagiolo, vite	Ragnetto rosso	1-6	7-21 gg

Vista la natura del prodotto è possibile che si formi del sedimento, è sufficiente agitare prima dell'uso per risolvere il problema.

Modalità d'uso: spruzzare sulla parte epigea della pianta nelle ore più fresche della giornata ad una distanza di circa 50 cm, compresa la parte inferiore delle foglie. Epoca di impiego: primavera ed estate, fino alla maturazione. **Attendere almeno 7 giorni dopo l'ultima applicazione prima di raccogliere.**

Prodotto previsto dall'allegato I, parte 1, del Reg. (UE) 2021/1165 che ne autorizza l'utilizzo nella produzione biologica.

Autorizzazione per l'immissione sul mercato non richiesta ai sensi dell'art. 28 del Reg. CE 1107/2009. **Agitare bene il prodotto prima dell'uso.**

CONFEZIONE

Bottiglia da 1L in cartone 12x1L

Tanica da 5L in cartone 4x5L

Contenuto netto: 1L-5L

KIPLANT REPRISE

SOSTANZA DI BASE

CHITOSANO (1,5%) ASPERGILLUS NIGER

Approvazione della sostanza di base (CAS n. 9012-76-4) ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/456 della commissione del 21 marzo 2022.

Purezza: Farmacopea Europea.

Metalli pesanti ≤20 ppm.

DISPOSIZIONI D'USO

Generalmente utilizzato negli alimenti, tuttavia sono autorizzati gli usi come Sostanza di Base con funzione di induttore di risposte di autodifesa delle piante nei confronti di funghi e batteri patogeni (elicitore con effetti fungicidi e battericidi).

MODALITÀ D'USO

Prodotto in sospensione acquosa.

Coltura	Epoca	N° applicazioni (min/max)	Intervallo minimo	Prodotto per ettolitro di acqua	Volume di acqua/h a	Dosaggio (min/max)
Olivo (Pieno campo e serra)	Dall'inizio dello sviluppo vegetativo sino al raggiungimento del 90% delle dimensioni finali del frutto (raccolta di olive verdi)	4-8	14 gg	3,3 – 6,6 L	200 - 400	6,6-26,6 L/ha
Uve da vino e da tavola (Pieno campo e serra)	Dalla comparsa delle prime foglie sino alla fase in cui la maggior parte delle bacche si toccano	4-8	14 gg	3,3 – 6,6 L	200 - 600	6,6-26,6 L/ha
Prati ornamentali, campi sportivi (Pieno campo e serra)	Per tutto il ciclo vegetativo	4-8	14 gg	3,3 – 6,6 L	200 - 400	6,6-26,6 L/ha
Piante ornamentali Euphorbia, Magnolia, Filadelfo, Faggio, Pioppo, Veronica hebe, Susino, Tè del Canada, Pero, Acero palmato, Rosa, Cotoneaster, Mora, Evonimo, Lilla, Forsizia, Mirtillo (Pieno campo, serra e indoor)	Per tutto il ciclo vegetativo	4-8	14 gg	3,3 – 6,6 L	200 - 400	6,6-26,6 L/ha
Bacche e piccola frutta Fragole, More, Mirtillo, Ribes, ecc. (Pieno campo e serra)	Dalla comparsa della prima foglia sino al raggiungimento della dimensione finale del frutto	4-8	14 gg	3,3 – 6,6 L	200 - 400	6,6-26,6 L/ha
Ortaggi, Cereali, Spezie, Colture foraggere (Pieno campo e serra)	Dalla comparsa della prima foglia sino al raggiungimento della dimensione finale della coltura	4-8	14 gg	3,3 – 6,6 L	200 - 400	6,6-26,6 L/ha

Prodotto previsto dall'allegato I parte 1 del Reg. (UE) 2022/456 che autorizza l'utilizzo nelle produzioni agricole biologiche del Chitosano (CAS n. 9012-76-4).

Autorizzazione per l'immissione sul mercato non richiesta ai sensi dell'art. 28 del Reg. CE 1107/2009. Il prodotto non ha intervallo di carenza.

Stoccaggio

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, bere o fumare durante l'uso. Conservare ad una temperatura non superiore a 30 °C o inferiore a 5 °C. Proteggere dalla luce solare. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi. **Agitare bene il prodotto prima dell'uso.**

CONFEZIONE

Bottiglia da 1 L in cartone 12x1L

Tanica da 5L e da 20 L

Peso netto: 1L-5L-20L

MICROIL

SOSTANZA DI BASE

OLIO DI GIRASOLE

Approvazione della sostanza di base ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1978 della commissione del 11 Novembre 2016.

Purezza: Farmacopea Europea.

Acido Oleico 14-40%

Acido Linoleico 48-74%

DISPOSIZIONI D'USO

E' generalmente impiegato nell'industria alimentare è altresì previsto l'uso come Sostanza di Base con funzione fungicida.

CARATTERISTICHE

L'olio di girasole è di origine naturale ed ha azione fungicida, in particolare sui funghi come l'oidio ed è da utilizzare secondo le modalità indicate in tabella:

Coltivazioni	Patologie	N° applicazioni (min/max)	Intervallo tra le applicazioni	Dosaggio per trattamento (ml/10L d'acqua) (min-max)	Dosaggio L/ha con 5/10 hl acqua ad ettaro
Pomodoro (Lycopersicum, Esculentum)	Oidio (Oidium Neolycopersici)	2-4	8 gg	10-50	1-20

MODALITÀ D'USO

Applicazione fogliare, prima, durante le fasi di getti apicali e poi, durante la fioritura e comunque quando il rischio di attacchi di oidio è maggiore.

Attendere almeno 2 giorni dopo l'ultima applicazione prima di raccogliere.

Prodotto previsto dall'allegato I parte 1 del Reg. (UE) 2021/1165 che ne autorizza l'utilizzo nelle produzioni agricole biologiche dell'Olio di girasole CAS n. 8001-21-6.

Autorizzazione per l'immissione sul mercato non richiesta ai sensi dell'art. 28 del Reg. CE 1107/2009.

Stoccaggio

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, bere o fumare durante l'uso. Conservare ad una temperatura non superiore a 30 °C o inferiore a 5 °C. Proteggere dalla luce solare. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi. **Agitare bene il prodotto prima dell'uso.**

CONFEZIONE

Bottiglia da 1L in cartone 12x1L

Tanica da 5L in cartone 4x5L

Contenuto netto: 1L-5L

MISCELA DI SOSTANZE DI BASE

- Reg. CE N. 1107/2009 Lecitina ed Equisetum arvense L. (equiseto)
- Reg. UE n. 1116/2015; Reg. UE n. 462/2014 -

Prodotto consentito in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2018/848 e del Reg. di esecuzione (UE) 2021/1165.

Contenuti garantiti

Emulsione acquosa di lecitina ed equisetato.

Lecitina (CAS. N. 8002-43-5-CIPAC e ECC n. E 322)

-Purezza come da Reg. CE N. 231/2012.

25% p/p

Prodotto ottenuto da decozione di fusti e foglie sterili ed essiccati di Equisetum arvense L.

-Purezza come da Farmacopea europea.

15% p/p

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

pH

6

Densità (g/cm³)

1,05 g/cc

PROPRIETÀ

La miscela delle sostanze di base lecitina ed equisetato ha una funzione fungicida in diverse colture (alberi da frutto, cetriolo, pomodoro e ornamentali). La componente lecitina contribuisce inoltre a rafforzare le difese naturali delle piante e, mediante meccanismi indiretti, migliora lo stato nutrizionale delle colture.

DOSI, INDICAZIONI E PRESCRIZIONI D'USO

Da utilizzarsi in accordo con le indicazioni specifiche incluse nel Rapporto del Riesame SANCO/12798/2014- rev. 2 e nel Rapporto del Riesame SANCO/12386/2013-rev. 6. Il prodotto è consigliato in applicazione preventiva fogliare nei momenti di maggiore probabilità di problemi fungini dovuti ad avverse condizioni meteo. Durante l'applicazione tutte le parti verdi della pianta devono essere ben bagnate. L'intervallo medio tra le applicazioni dipenderà dall'effetto desiderato, essendo quello abituale, ogni 7 - 15 giorni, a seconda dell'evoluzione della coltura. È particolarmente indicato nelle colture frutticole, vite, cetriolo, pomodoro, ribes, lattuga, indivia e ornamentali.

Dose approssimativa per l'applicazione fogliare: 2- 2,5 L/ha

Coltura	Dose totale di applicazione min - max (kg/ha)	Intervallo di applicazione min (giorni)	Numero di applicazioni min-max
Alberi da frutto (melo, pesco)ecc.)	5-45	5-7	2-12
Cetriolo	8	3-5	2-6
Pomodoro	8	4-7	2-6
Ornamentali	1-13 (kg/ha oppure kg/kg substrato)	1-5	1-12

È importante coprire adeguatamente l'intera parte verde della pianta durante l'applicazione senza spruzzare eccessivamente. Non trattare in presenza di umidità elevata o radiazione solare intensa. Agitare bene il prodotto prima dell'uso. Questo prodotto è biodegradabile e fotosensibile.

Si consiglia di eseguire sempre un test preliminare di miscelazione e compatibilità con il raccolto. Incompatibile con i prodotti a reazione molto acida o alcalina. Incompatibile con zolfo, oli e rame.

Le decantazioni che possono apparire nel tempo non alterano l'efficacia del prodotto. La Sostanza di base non ha effetto nocivo, né immediato né ritardato, sulla salute umana o degli animali né effetto inaccettabile sull'ambiente. Non è una sostanza potenzialmente pericolosa e non possiede una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici (Reg. CE N. 1107/2009-art. 23).

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

CONFEZIONE

Bottiglia da 1L in cartone 12x1L

Tanica da 5L in cartone 4x5L

Contenuto netto: 1L-5L

QUORUM ALLIANCE

SOSTANZA DI BASE

Chitosano cloridrato (2,0%)

Approvazione della sostanza di base ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014 della commissione del 23 maggio 2014.

Purezza: Farmacopea Europea, metalli pesanti ≤ 40 ppm.

DISPOSIZIONI D'USO

Generalmente utilizzato in medicina, negli alimenti, in cosmetica tuttavia sono autorizzati gli usi come **Sostanza di Base** con funzione di induttore di risposte di autodifesa delle piante nei confronti di funghi e batteri patogeni (**elicitore con effetti fungicidi e battericidi**).

MODALITÀ D'USO

Per impiego in sospensione acquosa (adacquamento con 200-400 l/ha) e per trattamento ai semi (bagnamento/immersione).

Coltura	Epoca	N° (min/max) applicazioni	Intervallo minimo	Dosaggio (cc) in 10 litri di acqua	Dosaggio (litri) a ettaro (min/max)
Bacche e piccola frutta (uva, fragole, more, mirtilli, ribes, ecc.)	Dalla comparsa della prima foglia sino allo sviluppo del frutto	4-8	2 settimane	250-1000	5-40
Vite				250-500	5-20
Arboree				250-500	5-20
Ortaggi, Cereali, Spezie e Foraggere				250-500	5-20
Piante ornamentali bulbose	Dalla comparsa della prima foglia sino a fine ciclo	1-8	5/7 giorni	250-1000	5-40
Bietola	Dalla comparsa della prima foglia sino a fine ciclo	1-8	5/7 giorni	250-1000	5-40
Trattamento spray al seme (Cereali e Patata)	Prima della semina	1	-	200-400	-
Trattamento spray al seme (Barbabietola da zucchero)	Prima della semina	1	-	200-800	-
Trattamento per immersione del bulbo di piante ornamentali	Prima dell'interramento	1	-	200-800	-

Prodotto previsto dall'allegato I parte 1 del Reg. (UE) 2021/1165 che ne autorizza l'utilizzo nelle produzioni agricole biologiche del Chitosano cloridrato CAS n. 70694-72-3.

Autorizzazione per l'immissione sul mercato non richiesta ai sensi dell'art. 28 del Reg. CE 1107/2009. Il prodotto non ha intervallo di carenza.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

CONFEZIONE

Bottiglia da 1L in cartone 12x1L

Tanica da 5L in cartone 4x5L

Contenuto netto: 1L-5L

FERTILIZZANTI
USO CONVENZIONALE

AZOLEMME

CONCIME MINERALE SEMPLICE

Soluzione di concime azotato con urea formaldeide

N 28

Azoto (N) totale	28%
Azoto (N) ureico	11,5%
Azoto(N) dell'urea formaldeide	16,5%

CARATTERISTICHE

AZOLEMME è un fertilizzante liquido a base di azoto ureico e metilenurea, con una bassissima concentrazione di biureto in grado di rilasciare l'azoto gradualmente.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

AZOLEMME si utilizza nei trattamenti fogliari e radicali secondo il seguente schema:

Trattamenti fogliari:

- Cereali (tra il primo e il secondo nodo): 19 kg/ettaro ripetuto 2 volte.
- Mais (tra l'apparizione della quarta fino all'ottava foglia): 19 kg/ettaro ripetuto 2 volte.
- Girasole e colza (alla prima fioritura): 19 kg/ettaro ripetuto 2 volte.
- Patata (dall'inizio della formazione dei tuberi): 19 kg/ettaro ripetuto 3 volte.
- Barbabietola da zucchero (80% della chiusura della fila): 19 kg/ettaro ripetuto 2 volte.
- Olivo (prima fioritura): 12,5 kg/ettaro ripetuto 3 volte.
- Agrumi (all'infiorescenza, poi alla crescita dei nuovi rametti e poi all'allegagione): 12,5 kg/ettaro ripetuto 3 volte.
- Alberi da frutto (all'allegagione e poi dopo 1 mese): 12,5 kg/ettaro ripetuto 2 volte.
- Vite (all'inizio dell'ingrossamento degli acini): 19 kg/ettaro ripetuto 3 volte.
- Fragola (a partire dalla pre-fioritura): 12,5 kg/ettaro ripetuti 5 volte.
- Pomodoro (a partire dalla pre-fioritura a intervallo di 15 giorni): 12,5 kg/ettaro ripetuto 5 volte.
- Cucurbitacee (a partire dalla pre-fioritura a intervallo di 15 giorni): 12,5 kg/ettaro ripetuto 4 volte.
- Lattuga (alla formazione del cespo a intervallo di 15 giorni): 12,5/ettaro ripetuto 4 volte.

Trattamenti radicali:

- Olivo (alla fine dell'inverno, al risveglio vegetativo): 100-150 kg/ettaro.
- Agrumi (alla fine dell'inverno, al risveglio vegetativo): 100-150 kg/ettaro.
- Frutteto (alla fine dell'inverno, al risveglio vegetativo): 100-150 kg/ettaro.
- Vite (alla fine dell'inverno, al risveglio vegetativo): 75-100 kg/ettaro.
- Ortaggi (all'inizio dello sviluppo vegetativo): 75-100 kg/ettaro.
- Lattuga (all'inizio dello sviluppo vegetativo): 100 kg/ettaro.

Si raccomanda di diluire almeno in 3 volte il suo volume d'acqua (cioè 1,25 kg di Azolemme in 3 litri di acqua).

COMPATIBILITA'

Può essere miscelato con altri prodotti chimici normalmente utilizzati. Tuttavia, vista la grande quantità di specie e varietà coltivate, è bene eseguire piccoli saggi di fitotossicità preliminari. Si raccomanda di consultare il nostro Ufficio Tecnico per qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato. Quando si eseguono le miscele, riempire il contenitore con il 20% di acqua, aggiungere i prodotti più acidi, aggiungere acqua fino al 60%. Accertarsi che il valore del pH sia compreso nell'intervallo 5-7, correggendolo se necessario. Aggiungere Azolemme e completare il riempimento del volume di acqua.

AVVERTENZE

Conservare il prodotto a temperature comprese tra 4°C e 30 °C. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

CONFEZIONE

Bottiglia da 1 kg
Tanica da 6kg in cartone 4x6kg
Tanica da 12kg
Tanica da 24 kg
Peso netto: 1,25 kg=1L

CE CABOR

CONCIME INORGANICO LIQUIDO SEMPLICE A BASE DI MACROELEMENTI

N (CaO) 5,7 (12) con Boro (B)

IN SOLUZIONE

Tenore dichiarato di nutrienti in massa:

Azoto (N) totale	5,7%
Azoto sotto forma nitrica	5,4%
Azoto sotto forma ammoniacale	0,3%
Ossido di calcio (CaO) idrosolubile	12%
Boro (B) ossiacido, idrosolubile	0,5%

INGREDIENTI

Nitrato di calcio¹ (CAS n° 15245-12-2); Acetato di calcio¹ (CAS n° 62-54-4); acido borico¹ (CAS n° 10043-35-3)
(1) CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo

USO E DOSI

Applicazione fogliare:

Agrumi e fruttiferi: 250-500 cm³/hL, in varie applicazioni. Applicare dall'allegagione fino all'inizio della raccolta.
Orticole: 200-400 cm³/hL, Intervenire dall'allegagione fino all'inizio della raccolta.

Floreali e ornamentali: 200-350 cm³/hL.

Piante da frutto tropicali: 250-500 cm³/hL, Intervenire dall'allegagione fino all'inizio della raccolta.

Olivo e vite: 250-500 cm³/hL.

Fertirrigazione:

Agrumi e fruttiferi: 4-8 L/Ha, durante tutto il ciclo.

Orticole: 4-6 L/Ha, durante tutto il ciclo.

Floreali e ornamentali: 3-5 L/Ha, durante tutto il ciclo.

Frutti tropicali: 4-8 L/Ha, durante tutto il ciclo.

Olivo e vite: 4-8 L/Ha.

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione.

EFFETTI AGRONOMICI: CABOR è appositamente formulato per trattare e prevenire i sintomi di carenza di calcio in qualsiasi coltura colpita. L'apporto del calcio è molto importante nella crescita e nella nutrizione della pianta, essendo un costituente essenziale delle pareti cellulari, con una funzione metabolica critica nell'eliminazione dei carboidrati e nella neutralizzazione degli acidi cellulari. Inoltre, il suo contenuto di boro facilita l'assorbimento e l'assimilazione dei cationi, migliora la traslocazione del calcio nella pianta, la formazione di pectina nelle membrane cellulari, la specializzazione dei tessuti meristemati e l'aumento del contenuto di calcio del frutto. Allo stesso modo, interviene nel metabolismo dei carboidrati e degli acidi nucleici, nella sintesi proteica e nell'allegagione, nonché nella sintesi delle vitamine del complesso B.

CONDIZIONI DI MAGAZZINAGGIO:

CABOR è compatibile con i prodotti più comunemente utilizzati, ad eccezione di quelli molto alcalini. Conservare e manipolare a temperature comprese tra 10°C e 30°C. Conservare il prodotto in un luogo asciutto e areato, lontano da fonti di calore.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

Contiene: ACIDO BORICO (CAS: 10043-35-3)



Pericolo

H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.

Consigli di prudenza:

P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità con la legislazione vigente relativa al trattamento dei rifiuti (D.Lgs. 25/2010).

Uso ristretto agli utilizzatori professionali.

UFI: JH00-Y0X8-U00K-M6UD

CONFEZIONE

Tanica da 5L in cartone 4x5L

Tanica da 20L

Contenuto netto: 5L-20L

CE CAL WASH

CONCIME INORGANICO LIQUIDO SEMPLICE A BASE DI MACROELEMENTI

N (CaO-MgO) 6,1 (6-4)

IN SOLUZIONE

Tenore dichiarato di nutrienti in massa:

Azoto (N) totale	6,1%
Azoto sotto forma nitrica	5,9%
Azoto sotto forma ammoniacale	0,2%
Ossido di calcio (CaO) idrosolubile	6%
Ossido di Magnesio (MgO) idrosolubile	4%

INGREDIENTI

Nitrato di magnesio¹ (CAS n° 10377-60-3); Nitrato di calcio¹ (CAS n° 15245-12-2)

(1) CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo

USO E DOSI

Agrumi e alberi da frutto: 20-30 L/ha

Orticole: 10-20 L/ha

Floreali e ornamentali: 10-20 L/ha

Alberi da frutto tropicali: 20-30 L/ha

Olivo e vite: 10-20 L/ha

Erbacee e legnose: 10-20 L/ha

Dopo la prima applicazione aumentare, mantenere o ridurre la dose in base ai risultati.

EFFETTI AGRONOMICI: CAL WASH è un correttore per terreni salini e salino-sodici. Il suo utilizzo è consigliato in terreni con problemi di salinità dovuti alle caratteristiche del terreno o alla qualità dell'acqua di irrigazione utilizzata. Con la sua applicazione, il PSI (Percentuale di Sodio Scambiabile) viene abbassato a valori accettabili per le colture. Si ottiene sostituendo il sodio assorbito nel complesso di scambio con calcio e magnesio. CAL WASH aumenta la capacità di scambio cationico (CEC). In questo modo migliora la struttura del terreno e favorisce il condizionamento delle radici e la loro assimilazione dei nutrienti. CAL WASH è un fertilizzante che modifica la conduttività elettrica del terreno fino a renderla ottimale per lo sviluppo della coltura piantata. Migliora le caratteristiche edafiche, favorendo lo sviluppo radicale e l'assorbimento dei nutrienti non disponibili.

CONDIZIONI DI MAGAZZINAGGIO:

CAL WASH è compatibile con la maggior parte dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari normalmente utilizzati, eccezione dei prodotti molto alcalini. Conservare e manipolare a temperature comprese tra 10°C e 30°C. Conservare il prodotto in un luogo asciutto ed areato, lontano da fonti di calore.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso.



Pericolo

H315 Provoca irritazione cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza:

P264 Lavare accuratamente ... dopo l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

UFI: PE00-G07V-J002-YV8A

CONFEZIONE

Tanica da 5L in cartone 4x5L

Tanica da 20L

Contenuto netto: 5L-20L

HARMONIA

CONCIME MINERALE SEMPLICE
Soluzioni Ammoniacali

Azoto (N) ammoniacale	30%
-----------------------	-----

CARATTERISTICHE

Harmonia si presenta come un liquido incolore caratterizzato da un forte odore pungente. L'azoto ammoniacale apportato viene trattenuto temporaneamente nel terreno dalle sostanze colloidali e rilasciato gradualmente alla pianta che lo utilizza per la sintesi di amminoacidi e di altri composti organici.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

HARMONIA si utilizza in fertirrigazione nella fase di preparazione del terreno e nelle diverse fasi vegetative dell'accrescimento della pianta. La dose consigliata varia dai 10 ai 20 litri per ettaro. È preferibile ripetere il trattamento 3-4 volte durante il ciclo vegetativo della pianta.

COMPATIBILITÀ

Vista la grande quantità di specie e varietà coltivate, è bene eseguire piccoli saggi di fitotossicità preliminari. Si raccomanda di consultare il nostro Ufficio Tecnico per qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato.

AVVERTENZE

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 40°C.

Contiene: AMMONIACA



Pericolo

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H335 Può irritare le vie respiratorie. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

Consigli di prudenza:

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. P501 Smaltire il prodotto / recipiente nel rispetto della normativa riguardante i residui pericolosi, i contenitori o i residui dei contenitori.

UFI: D800-F0V2-X003-N636

CONFEZIONE

Tanica da 20kg
Cisternetta IBC da 900kg

Peso netto: 0,89kg=1L

CE HICAL

CONCIME INORGANICO SOLIDO SEMPLICE A BASE DI MACROELEMENTI

Tenore dichiarato di nutrienti in massa:

Ossido di calcio (CaO) idrosolubile	40,5%
-------------------------------------	-------

INGREDIENTI

Calcio formiato¹ (CAS n° 544-17-2)

¹CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo

Granulometria: polvere. Il 90 % del prodotto passa attraverso un setaccio di 1 mm.

USO E DOSI

HICAL può essere applicato per via sia fogliare sia radicale ed è altamente solubile in acqua; durante la preparazione mantenere il serbatoio in agitazione; sciogliere il prodotto prima di eventuali altri concimi o agrofarmaci e distribuire in tempi rapidi. Le dosi di impiego nei trattamenti fogliari sono le seguenti:
-Frutticoltura, drupacee, Kiwi, melo, pero: 3-5 kg/ha quattro trattamenti da caduta petali ogni 15-20 giorni.

Si consiglia un intervento in pre-raccolta per prevenire le fisiopatie da frigo.

- Viticoltura: 3-5 kg/ha dalla fase di post-allegagione intervenire ogni 15-20 giorni eventualmente in abbinamento a trattamenti antiperonosporici.

-Finocchio, indivie e scarole, lattughe e sedano: 2-4 kg/ha dal trapianto ogni 10-15 giorni.

-Cocomero, fragola, melone, zucchini: 2-4 kg/ha da inizio allegagione trattare ogni 15 giorni.

-Melanzana, peperone, pomodoro: 2-4 kg/ha ogni 10-15 giorni da inizio allegagione.

-Piante in vaso, semenzai, vivai: 300-500 g/1000 m² ogni 10-15 giorni.

Le dosi di impiego per i trattamenti radicali sono: 150-200 g/ per m³ di terreno esplorato dalle radici, in base al piano nutrizionale, effettuando brevi intervalli (6-8 giorni) per tipologia o cultivar che potrebbero presentare carenze di calcio.

USO PROFESSIONALE. Contattare l'azienda per raccomandazioni più specifiche.

CONDIZIONI DI MAGAZZINAGGIO:

Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Immagazzinare solo nei contenitori originali. Non immagazzinare con ossidanti.

Contiene: **CALCIO FORMIATO** (CAS: 544-17-2)



Pericolo
H318 Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza:

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Informazioni generali:

HICAL consente di apportare calcio anche in piante che presentano eccessi di vigore e di sviluppo vegetativo grazie alla sua composizione che è completamente priva di azoto, a differenza del nitrato di calcio. Grazie alla sua spiccata compatibilità con i tessuti vegetali, HICAL raggiunge rapidamente le parti della pianta maggiormente carenti e quindi più bisognose di calcio e consente di apportarne significative quantità in forma prontamente assimilabile (fino a 1,5-2 kg/ha per ogni trattamento). HICAL può essere distribuito nel corso di tutte le fasi dello sviluppo, a partire dalla prefioritura fino alla raccolta e in qualsiasi momento della giornata, poiché la temperatura ambientale non interferisce sull'assorbimento e sulla traslocazione. HICAL inoltre induce un notevole miglioramento delle caratteristiche qualitative e organolettiche del frutto consentendone anche un prolungamento della conservazione.

CONFEZIONE

Busta da 1 kg

Busta da 5 kg

Peso netto: 1 kg-5kg

CE KIPLANT HB15

CONCIME INORGANICO LIQUIDO SEMPLICE A BASE DI MACROELEMENTI

N 15 (CaO) (6,1)

IN SOLUZIONE

Tenore dichiarato di nutrienti in massa:

Azoto (N) totale	15%
Azoto sotto forma nitrica	9%
Azoto sotto forma ammoniacale	6%
Ossido di calcio (CaO) idrosolubile	6,1%

INGREDIENTI

Nitrato di calcio¹ (CAS n° 10124-37-5); Nitrato ammonico¹ (CAS n° 6484-52-2)

¹CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo

USO E DOSI

Actinidia (Kiwì): a gemma ferma, Kiplant HB15 si usa alla dose del 7% (sul volume d'acqua) in miscela con Kiplant Inducer al 5%. Il volume d'acqua consigliato è pari a 800–1000 L/ha, bagnando bene la vegetazione.

Mela 5-6 l / 100 l di acqua, utilizzando 800 litri di acqua per ettaro.

Ciliegia 8 l / 100 l di acqua, utilizzando 800 litri di acqua per ettaro.

Si consiglia prima di eseguire trattamenti estesi effettuare applicazioni limitate a 5-10 piante /alberi.

Agitare energicamente il prodotto prima dell'uso. Non superare le dosi per ettaro indicate.

Consulta il tecnico prima di applicare il prodotto in varietà o specie in cui non è stata eseguita una prova precedente.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Kiplant HB15 è un interruttore della dormienza dell'Actinidia (kiwì) da utilizzare in associazione con Kiplant Inducer. La loro azione combinata favorisce l'uscita dalla dormienza e uniforma il germogliamento; incrementa i fiori per germoglio, uniforma la fioritura e migliora l'allegagione. Si consiglia l'applicazione di Kiplant HB15, attivatore minerale che assicura un notevole aumento metabolico delle colture, in combinazione con Kiplant Inducer che fornisce un complemento di azoto e calcio aggiuntivo.

CONDIZIONI DI MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a temperatura e pressione ordinaria. Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 40°C.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E SULL'AMBIENTE



Attenzione

Indicazioni di pericolo:

H315 Provoca irritazione cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza:

P264 Lavare accuratamente ... dopo l'uso.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere l'udito/...

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/...

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

UFI: 23F6-0Y94-U96P-P0Q5

CONFEZIONE

Contenuto netto: 20L

CE KIPLANT INDUCER

CONCIME INORGANICO LIQUIDO SEMPLICE A BASE DI MACROELEMENTI
N 15,6 (CaO) (6,1)

IN SOLUZIONE

Tenore dichiarato di nutrienti in massa:

Azoto (N) totale	15,6%
Azoto sotto forma nitrica	6,5%
Azoto sotto forma ammoniacale	3%
Azoto sotto forma ureica	6,1%
Ossido di calcio (CaO) idrosolubile	6,1%

INGREDIENTI

Nitrato di calcio¹ (CAS n°10124-37-5); Nitrato ammonico¹ (CAS n° 6484-52-2); Urea¹ (CAS n° 57-13-6)

¹CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo

USO E DOSI

Actinidia (Kiwi): a gemma ferma, Kiplant Inducer si usa alla dose del 5% (sul volume d'acqua) in miscela con Kiplant HB15 al 7%. Il volume d'acqua consigliato è pari a 800–1000 L/ha, bagnando bene la vegetazione.

Melo: 4-5 l / 100 l di acqua con un flusso di 800 l / ha. Inserisci Kiplant HB15 concentrazione di 5-6 l / 100 l di acqua.

Ciliegia: 5 l / 100 l di acqua, utilizzando 800 l / ha. Si consiglia di aggiungere Kiplant HB-15 alla concentrazione di 8 l / 100 l di acqua.

Prima di effettuare trattamenti vasti si consiglia di effettuare applicazioni limitate a 5-10 piante / alberi.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Kiplant Inducer è un interruttore della dormienza dell'Actinidia (kiwi) da utilizzare in associazione con Kiplant HB15. La loro azione combinata favorisce l'uscita dalla dormienza e uniforma il germogliamento; incrementa i fiori per germoglio, uniforma la fioritura e migliora l'allegagione. Si consiglia l'applicazione di Kiplant Inducer, che fornisce un complemento di azoto e calcio aggiuntivo, in combinazione con kiplant HB15, attivatore minerale che assicura un notevole aumento metabolico delle colture.

CONDIZIONI DI MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a temperatura e pressione ordinaria. Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 40°C.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E SULL'AMBIENTE



Attenzione

Indicazioni di pericolo:

H315 Provoca irritazione cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza:

P264 Lavare accuratamente ... dopo l'uso.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere l'udito/...

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/...

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

UFI: 6NXU-Q275-976G-DRD1

Questo concime contiene urea, che può rilasciare ammoniaca e avere ripercussioni sulla qualità dell'aria. A seconda delle condizioni locali, devono essere adottate adeguate misure correttive.

CONFEZIONE

Contenuto netto: 20L

CE OKSIACID

CONCIME INORGANICO LIQUIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI

NP 4-25

IN SOLUZIONE

Tenore dichiarato di nutrienti in massa:

Azoto (N) totale	4%
Azoto sotto forma ureica	4%
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) totale	25%
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) idrosolubile	25%
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in citrato ammonico neutro	25%

INGREDIENTI

-Acido fosforico¹ (CAS n° 7664-38-2) - Urea¹ (CAS n° 57-13-6)

¹CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo

USO E DOSI

AZIONE NUTRIENTE:

-Applicazione fogliare: 100-150 g/hl

- Fertirrigazione: 1,5-2 kg/ha

Dosi e modalità di applicazione sopra riportate sono da intendersi come raccomandazioni generali e che non tengono in considerazione eventuali condizioni pedoclimatiche particolari o limitazioni imposte dagli enti ufficiali. Rivolgersi al proprio consulente per adattare le dosi raccomandate al piano di fertilizzazione aziendale ed evitare quindi concimazioni eccessive e/o sprechi di nutrienti.

• **REGOLAZIONE pH:** per acque con pH 7.5-8 si consigliano le seguenti dosi indicative:

- per ottenere livelli di pH di 6-6,5: 60-90 g/hl

- per ottenere livelli di pH di 5-5,5: 100-120 g/hl

Il raggiungimento del pH desiderato è indicato dal colore assunto dall'acqua confrontato con quello della scala colorimetrica.

CONDIZIONI DI MAGAZZINAGGIO

Conservare e manipolare a temperature comprese tra 10 e 30°C. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E SULL'AMBIENTE

Contiene: ACIDO FOSFORICO (CAS: 7664-38-2)



Pericolo

H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza:

P260: Non respirare gli aerosol. P264: Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P301+P330+P331: IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con la legislazione vigente relativa al trattamento dei rifiuti (D.Lgs.25/2010).

Questo concime contiene urea, che può rilasciare ammoniaca e avere ripercussioni sulla qualità dell'aria. A seconda delle condizioni locali, devono essere adottate adeguate misure correttive.

DICHIARAZIONI ADDIZIONALI:

OKSIACID è un formulato liquido specificatamente indicato in caso di terreni ad elevato pH e in presenza di acque particolarmente dure: la sua azione acidificante lo rende perfetto per modificare il pH dell'acqua dura fino al raggiungimento dei valori ottimali, che permettano la corretta attività dei diversi concimi impiegati. Il confronto del colore della soluzione con la scala colorimetrica presente in etichetta, permette l'individuazione del livello di pH raggiunto. Azioni e vantaggi dell'utilizzo di OKSIACID: **POTENZIA LA CAPACITÀ VEICOLANTE all'interno dell'apparato fogliare INTENSIFICA L'ATTIVITÀ RADICALE delle colture durante le prime fasi di sviluppo.** La responsabilità di chi immette il prodotto in commercio, è limitata solamente alla fornitura dei prodotti controllati alla vendita, conformi alla composizione indicata nell'imballaggio e venduti nell'imballaggio originario. Il distributore non può essere considerato responsabile dell'uso errato e degli effetti dovuti a fattori meteorologici, alla natura del terreno, alla sensibilità della coltura, ai metodi di coltivazione. Da non vendersi sfuso. AGITARE PRIMA DELL'USO

UFI: NC00-Y0CJ-Q000-9QE3

CONFEZIONE

Bottiglia da 1kg in cartone 20x1kg

Tanica da 5kg

Peso netto: 1kg-5kg

PROSILK

CONCIME MINERALE SEMPLICE

Soluzione di Sali potassici B.T.C.

Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua	10%
---	-----

CARATTERISTICHE

Prosilk è un concime a base di silicato di potassio completamente solubile. Promuove l'accrescimento delle piante incrementando la fotosintesi. Aumenta la robustezza di foglie e steli, riducendo la traspirazione e incrementando l'efficienza dell'assorbimento dell'acqua e la qualità delle colture. PROSILK contiene anche il 24% di silicio, che è un elemento benefico per le piante.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

PROSILK si utilizza nei trattamenti fogliari alla dose di 100 -200cc/100 litri.

COMPATIBILITÀ

Evitare l'associazione con zolfo e prodotti sistemici. Nelle miscele con oli vegetali non superare la dose di 100cc/100 litri. È consigliabile sempre effettuare saggi preliminari, vista l'elevata disponibilità di specie e varietà.

AVVERTENZE

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 32°C. Aggiungere sempre il prodotto al volume d'acqua finale e non viceversa. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

CONFEZIONE

Bottiglia da 1L in cartone 12x1L
Tanica da 5L in cartone 4x5L

Peso netto: 1,35kg=1L

QUANTICO

CONCIME MINERALE COMPOSTO

NPK 6-5-43 con microelementi

Azoto (N) totale	6%
Azoto (N) nitrico	5,2%
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua	5%
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua	4,5%
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua a basso tenore di cloro	43%
Boro (B) solubile in acqua	0,05%
Rame (Cu) solubile in acqua	0,02%
Rame (Cu) chelato con EDTA	0,02%
Ferro (Fe) solubile in acqua	0,63%
Ferro (Fe) chelato con EDTA	0,63%
Manganese (Mn) solubile in acqua	0,32%
Manganese (Mn) chelato con EDTA	0,32%
Molibdeno (Mo) solubile in acqua	0,04%
Zinco (Zn) solubile in acqua	0,06%
Zinco (Zn) chelato con EDTA	0,06%
Agente chelante: EDTA	
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità alla frazione chelata:	3 - 11

CARATTERISTICHE

Quantico è un prodotto appositamente studiato per aumentare la qualità, migliorando la pezzatura e la densità dei frutti. Inoltre, facilita la sintesi delle proteine e permette l'aumento del grado Brix. Allo stesso modo favorisce la maturazione dei frutti accentuandone il colore, l'odore e il sapore senza ridurne la vita post-raccolta. QUANTICO garantisce il definitivo salto di qualità per tutti i tipi di colture.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Applicazione fogliare:

Agrumi e alberi da frutto: 300-500 g/hl, a seconda delle esigenze.

Orticole: 350-500 g/hl, a seconda delle esigenze.

Floreali e ornamentali: 300-500 g/hl, a seconda delle esigenze.

Piante da frutto tropicali: 300-500 g/hl, a seconda delle esigenze.

Olivo e vite: 300-600 g/hl, a seconda delle esigenze.

Erbacee e legnose: 300-600 g/hl, a seconda delle esigenze.

Fertirrigazione:

Agrumi e fruttiferi: 3-7 Kg/Ha.

Orticole: 3-7 Kg/Ha.

Fiori e ornamentali: 3-5 Kg/Ha.

Alberi da frutto e tropicali: 3-7 Kg/Ha.

Olivo e vite: 6-9 Kg/Ha.

Erbacea e legnosa: 7-10 Kg/Ha.

COMPATIBILITÀ

QUANTICO è compatibile con la maggior parte dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari normalmente utilizzati. Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

AVVERTENZE

Conservare il prodotto a temperature comprese tra 5°C e 35°C. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibili su richiesta.

CONFEZIONE

Sacchetto da 5kg in cartone 4x5kg

Peso netto: 5kg

CE RAIZOOK

CONCIME ORGANO-MINERALE LIQUIDO

NPK 3-6-3 con microelementi

Tenore dichiarato di nutrienti in massa:

Azoto (N) totale	3%
Azoto (N _{org}) organico, da proteine vegetali	1,8%
Azoto sotto forma ammoniacale	1,2%
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) totale	6%
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) idrosolubile	6%
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in citrato ammonico neutro	6%
Ossido di potassio (K ₂ O) totale	3%
Ossido di potassio (K ₂ O) idrosolubile	3%
Carbonio organico (C _{org})	6,3%
Sostanza secca	25%
Boro (B) ossiacido idrosolubile	0,1%
Rame (Cu) chelato con EDTA idrosolubile	0,05%
Ferro (Fe) chelato con EDTA idrosolubile	0,4%
Manganese (Mn) chelato con EDTA idrosolubile	0,2%
Molibdeno (Mo) ammonio idrosolubile	0,01%
Zinco (Zn) chelato con EDTA idrosolubile	0,1%
Intervallo di pH che garantisce una stabilità accettabile della frazione chelata	4-9

INGREDIENTI

Proteine idrolizzate vegetali¹ (CAS n° 100209-45-8); Ammonio diidrogeno fosfato¹ (CAS n° 7722-76-1); Potassio carbonato (CAS n° 584-08-7).

¹CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo

USO E DOSI

Applicazione fogliare: Agrumi e alberi da frutto: 50-100 cm³/hl. Ripetere il trattamento settimanalmente all'inizio del ciclo. Orticole: 50-100 cm³/hl ogni 15-20 giorni. Fiori e ornamentali: 50-100 cm³/hl ogni 15-20 giorni. Semenzaio e vivai: 50-100 cm³/hl, iniziare il trattamento nella terza settimana.

Fertirrigazione: Agrumi e alberi da frutto: 2-4 L/Ha, prima e dopo la fioritura. Orticole: Il primo mese 1 L/Ha e settimana, il resto della coltura, 2 L/Ha ogni 15 giorni. Fiori e piante ornamentali: Nel primo mese 1 L/Ha a settimana, il resto della coltura, 2 L/Ha ogni 15 giorni. Semenzaio e vivai: 2 L/Ha/settimana.

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione.

EFFETTI AGRONOMICI:

Il suo utilizzo durante le prime fasi di coltivazione favorisce la crescita dell'apparato radicale, così la pianta può esplorare un maggior volume di terreno. Indicato su terreni con problemi di drenaggio e terreni compatti o in caso di irrigazione a goccia. La loro combinazione fornisce a RAIZOOK l'efficacia nello sviluppo rapido e sano delle radici, facilitando raccolti eccellenti e abbondanti.

CONDIZIONI DI MAGAZZINAGGIO

Compatibile con la maggior parte dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari. Non mescolare con zolfo, rame o oli. Conservare e manipolare a temperature comprese tra 10°C e 30°C. Conservare il prodotto in un luogo asciutto ed areato, lontano da fonti di calore. Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E SULL'AMBIENTE

Contiene: ACIDO BORICO (CAS: 10043-35-3)



Pericolo

H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.

Consigli di prudenza:

P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità con la legislazione vigente relativa al trattamento dei rifiuti (D.Lgs. 25/2010).

Uso ristretto agli utilizzatori professionali.

UFI: FC00-Y0JG-700K-9HP8

CONFEZIONE

Bottiglia da 1L in cartone 16x1L

Contenuto netto: 1L

SAL WASH

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

Poliacrilammide anionica in soluzione acquosa
Ad azione sul suolo

Poliacrilammide anionica solubile in acqua	50%
Acrilammide libera	0,05%

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

SAL WASH è un prodotto utile per ridurre lo stress e le carenze in suoli salini. Agisce neutralizzando i sali liberi in eccesso che vengono eliminati dalla zona radicale per lisciviazione, riducendo l'EC.

Si ristabilisce l'equilibrio osmotico e la pianta aumenta l'assorbimento di acqua e minerali. SAL WASH è compatibile con tutti i sistemi di irrigazione ed i risultati sulle piante sono visibili già dopo 2-5 giorni (si può osservare una riduzione delle carenze e una ripresa di vigore vegetativo).

La dose di utilizzo è di 5 kg/ha fino a 10 kg/ha a seconda delle necessità.

COMPATIBILITÀ

Meglio utilizzare il prodotto da solo.

AVVERTENZE

Conservare il prodotto a temperature comprese tra 4 e 35°C, in un luogo asciutto e ben ventilato. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia. Tenere lontano da bambini, animali domestico ed alimenti. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua per 15 minuti.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

CONFEZIONE

Tanica da 5 kg in cartone 4x5kg

Tanica da 10 kg

Peso netto: 5 kg=4,17 litri

PRODOTTI
COMPLEMENTARI

PODEROSO

COADIUVANTE DI CRESCITA PER LE PIANTE

Grazie alle materie prime utilizzate il prodotto contiene:

Azoto	1,6%
Fosforo	1,8%
Potassio	5%
Carbonio organico	4,4%
Vitamine	2,2%
Aminoacidi essenziali	2%
Citochinine naturali	0,15%

COMPOSIZIONE

Estratto vegetale a base di polifenoli arricchito con metabisolfito di potassio ed acido salicilico. I materiali impiegati ed i metodi di lavorazione sono determinanti per la qualità del prodotto e le sue caratteristiche merceologiche.

CARATTERISTICHE

PODEROSO è un prodotto con un'elevata capacità vascolare e antiossidante che determina il corretto equilibrio e funzionamento di xilema e floema, potenziando la capacità di produzione di linfa grezza ed elaborata e rafforza la pianta nel suo complesso. Le sue caratteristiche biochimiche consentono un equilibrato funzionamento dei processi di assorbimento dei nutrienti e la loro trasformazione e distribuzione nei tessuti vegetali. La conseguenza diretta è una maggiore capacità fotosintetica della pianta, oltre a un corretto equilibrio fisiologico che permette di ottimizzare il consumo energetico nei processi fondamentali del funzionamento della pianta stessa.

INDICAZIONI PER L'USO

PODEROSO è il complemento ideale per rafforzare l'attività fisiologica della pianta in qualsiasi fase fenologica, si consiglia quindi di applicarlo durante l'intero ciclo colturale e soprattutto nei momenti più delicati come: sviluppo vegetativo iniziale, prefioritura, allegagione e ingrossamento dei frutti. I risultati di aumento della capacità produttiva (attività fotosintetica) e di incremento della raccolta (pesi specifici e omogeneità delle pezzature dei frutti) sono immediatamente apprezzabili.

MODO D'USO

PODEROSO è compatibile con tutte le colture. Le dosi di applicazione generalmente consigliate sono:

-In applicazione fogliare: da 0,5 a 1,0 L/ha/applicazione da dare per almeno tre volte per totali 1,5-2,5 L/ha.

-In irrigazione localizzata: da 1,0 a 1,5 L/ha/applicazione da dare per almeno tre volte per totali 3-5 L/ha.

PODEROSO non ha le caratteristiche né di un fertilizzante né di un fitosanitario. La confezione, la composizione e la qualità dei prodotti impiegati forniscono sufficienti informazioni ai consumatori a norma dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 206/2005 s.m.i.



Attenzione

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle.

Consigli di prudenza:

P261 Evitare di respirare i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso.

P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

UFI GS00-F0HF-M00J-S22W

CONFEZIONE

Bottiglia da 1L in cartone 12x1L

Tanica da 5L in cartone 4x5L

Contenuto netto: 1L-5L

ROLL TRAP

TRAPPOLE PER CONTROLLO BIOLOGICO DEI PARASSITI

CARATTERISTICHE

Rotolo di pellicola elastica con colla, disponibile in colori specifici per i diversi parassiti più frequenti. L'utilizzo permette il controllo dei parassiti non appena si rileva la presenza dei primi insetti. Collante ad alta densità che favorisce la cattura ottimale degli insetti e prestazioni elevate. Lamina trattata contro i raggi UV, per rendere la trappola più resistente alla luce artificiale e alle condizioni climatiche avverse. Colori intensi per attirare un maggior numero di specie e aumentare le catture.

COLORI DISPONIBILI	AVVERSITÀ
AZZURRO	Tripidi
GIALLO	Aleurodidi, Mosca dell'olivo e della frutta, Tripidi, Afidi
NERO	Tuta assoluta
ROSSO	Drosophila suzukii

DIMENSIONI

Rotolo 300mm X 100m

WHITE IBIZA

OMBREGGIANTE PER SERRE

Carbonato di calcio	89%
---------------------	-----

CARATTERISTICHE

WHITE IBIZA viene utilizzato per ombreggiare le serre. Ha eccellente adesione, resistenza al vento, resistenza alla pioggia ed è solubile in acqua. Il prodotto ha una durata da 2 a 3 mesi.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Per un idoneo ombreggiamento, si raccomanda una diluizione di 25 kg di prodotto in 100 litri di acqua. Agitare il prodotto fino a completo scioglimento. Applicare con pompe irroratrici. Non applicare se si prevede pioggia.

AVVERTENZE

Conservare in un luogo asciutto. Prima del suo utilizzo indossare mascherina e guanti di protezione. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

CONFEZIONE

Sacco da 25kg

Peso netto: 25kg

WHITE IBIZA CLEANER

PULIZIA TETTI SERRE

CARATTERISTICHE

WHITE IBIZA CLEANER è studiato per pulire i tetti delle serre. Rimuove le tracce di prodotti sbiancanti dalle coperture delle serre. Prodotto adatto a tutti i tipi di coperture per serre (plastica, vetro, ecc.).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Le dosi possono variare a seconda del grado di deterioramento del prodotto da pulire, della sua tipologia e della sua durata. Da 10-40L di **WHITE IBIZA CLEANER**/100L di acqua. Si consiglia di effettuare una prova preventiva su circa 1 m² per verificare l'efficacia del prodotto sul tetto da pulire. Non aggressivo nei confronti di fili o plastica.

ALTRO MODO D'USO

Adatto per la pulizia di filtri e attrezzature agricole. L'acqua di pulizia, dopo l'applicazione della soluzione del prodotto, non provoca danni alle piante. Non deve essere miscelato con altri prodotti. Si raccomanda di pulire l'attrezzatura utilizzata nell'applicazione con acqua pulita.

INDICAZIONI PER L'USO

WHITE IBIZA CLEANER viene applicato sulla copertura della serra.

Per ottenere i migliori risultati con è necessario seguire i seguenti passaggi;

Il prodotto verrà versato nel serbatoio dell'acqua e miscelato con l'acqua. L'acqua deve essere pulita e priva di contaminanti fisici e chimici. **WHITE IBIZA CLEANER** si dissolve completamente in acqua. Non è necessario mantenere un'agitazione continua durante l'applicazione. Spruzzare la soluzione **WHITE IBIZA CLEANER** sulla copertura della serra. Quindi, pulire eventuali residui di prodotto con acqua pressurizzata. Il dosaggio approssimativo dipende dal tipo e dalla durata del prodotto da pulire: a seconda dello spessore e dell'età dello strato di prodotto da rimuovere, è possibile regolare la concentrazione di **WHITE IBIZA CLEANER**.

AVVERTENZE

Il prodotto deve essere applicato in forma spray sulla superficie da pulire per inumidirla.

Non applicare mai grandi quantità di soluzione sulla plastica per evitare perdite all'interno della serra.

Non applicare mai il prodotto sotto pressione, poiché lo scopo è quello di agire sulla superficie da pulire ed evitare così perdite all'interno della serra. Se la soluzione del prodotto dovesse fuoriuscire nella serra, potrebbero verificarsi piccole ustioni sulle foglie delle colture.

CONFEZIONE

Contenuto netto: 20 L

WHITE IBIZA SIX

REGOLATORE DI TEMPERATURA

CARATTERISTICHE

WHITE IBIZA SIX è un prodotto liquido idrosolubile a base di aggregati e additivi selezionati, studiato per essere applicato su tutti i tipi di coperture per serre (plastica, vetro, ecc.).

Inoltre, contribuisce a modificare il clima all'interno della serra riducendo la radiazione solare incidente. Favorisce il controllo dei seguenti parametri climatici: radiazioni, temperatura, umidità.

WHITE IBIZA SIX è dotato di elevata aderenza ed elevata deformabilità sulla copertura della serra; a sua volta ha un elevato potere coprente. Inoltre dispone delle seguenti caratteristiche:

- Prodotto liquido che si dissolve facilmente in acqua.
- Elevata aderenza.
- Elevata deformabilità.
- Ottimo potere coprente.
- Elevato potere di riflessione.
- Bassa sedimentazione durante l'applicazione.
- Prodotto ideale per lo schiarimento tra dicembre e aprile.
- Durata approssimativa da 5 a 6 mesi a seconda delle condizioni meteorologiche.

INTENSITÀ DELL'OMBRA	
MOLTO BASSO	1L/200L acqua
BASSO	1L/100L acqua
MEDIO	1L/80L acqua
ALTO	1L/60L acqua

INDICAZIONI PER L'USO

WHITE IBIZA SIX è applicato alla copertura della serra.

Per ottenere i migliori risultati è necessario seguire i seguenti passaggi;

Il prodotto verrà agitato nel contenitore originale utilizzando un agitatore a bassi giri fino a ottenere l'omogeneità appropriata. Versare il prodotto nel serbatoio dell'acqua pulita, priva di qualsiasi contaminazione fisica o chimica. Utilizzando idonei solventi, diluire il prodotto in acqua. È importante disporre di un sistema di rimozione idoneo per garantire la completa dissoluzione. Mantenere l'agitazione continua dei solventi durante l'intero periodo di applicazione del prodotto.

AVVERTENZE

Non applicare in caso di rischio di gelo, pioggia o vento forte. Non deve essere miscelato con altri prodotti. Per una corretta adesione, la copertura deve essere priva di polvere, grasso o precedenti prodotti sbiancanti. Non applicare su tetti bagnati. La durabilità del prodotto dipende da diverse variabili al di fuori del nostro controllo, come ad esempio precipitazioni massime, grandine, forti venti, durata della plastica e/o pulizia inadeguata della copertura. Si raccomanda di pulire l'attrezzatura utilizzata nell'applicazione con acqua pulita. Se è necessario rimuovere il prodotto dalla copertura della serra, si consiglia di farlo con acqua a pressione e poi strofinare con mezzi meccanici o manuali.

CONFEZIONE

Contenuto netto: 18 L





A series of horizontal lines for writing, starting from the top right and extending across the page.



Fertilidea® srl

Via Trav.sa Vic.le Messigno, 7
80045 Pompei (NA) Tel. e Fax 081 8508261

www.fertilidea.it **info@fertilidea.it**

whatsapp: 3355922525

Codice destinatario 5RU082D

P.IVA 05362441213

Seguici sui Social



Fertilidea® - Cat. 01.02/26

CATALOGO UFFICIALE FERTILIDEA s.r.l. 2026