

BIYO GRANULO TOP

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

Inoculo di funghi micorrizici

Tipo di ammendante organico:	Vermicompost da letame bovino
Contenuto in micorrize	1%
Contenuto in batteri della rizosfera (<i>Bacillus spp.</i> , <i>Pseudomonas spp.</i> , <i>Azospirillum spp.</i>)	1 x10 ⁸ UFC/g
Contenuto in <i>Trichoderma</i>	1x10 ⁸ UFC/g

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: inoculi di funghi endomicorrizici, batteri autorizzati ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 1.9.6, del regolamento (UE) 2018/848, Vermicompost da letame bovino non proveniente da allevamenti industriali e trichoderma.

Il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati ed organismi patogeni (salmonella, coliformi fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi).

CARATTERISTICHE

BIYO GRANULO TOP è un prodotto ad azione specifica ad azione sul suolo, formulato su ammendante organico (vermicompost da letame bovino) e arricchito con microrganismi utili: funghi endomicorrizici, batteri della rizosfera e *Trichoderma*. Il *Trichoderma* è un fungo naturalmente presente nel terreno che colonizza la rizosfera e la superficie radicale, contribuendo a creare un ambiente biologicamente attivo e favorevole allo sviluppo dell'apparato radicale. La sua presenza nel suolo supporta l'equilibrio microbiologico e i processi di trasformazione della sostanza organica, favorendo una migliore disponibilità degli elementi nutritivi e una più efficiente esplorazione del volume di terreno da parte delle radici. In sinergia con micorrize e batteri della rizosfera, il *Trichoderma* aiuta a migliorare vitalità e funzionalità della rizosfera, con effetti positivi su attecchimento e ripresa vegetativa. Il prodotto contiene inoltre probiotici di origine vegetale, distinti dalla matrice organica, utili a sostenere l'attività biologica del suolo e della rizosfera.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

BIYO GRANULO TOP si utilizza preferibilmente alla semina, al trapianto, al rinvaso e in generale nei momenti in cui è importante favorire l'attività biologica del suolo e della rizosfera. Per ottenere la massima efficacia è consigliata una distribuzione in prossimità delle radici (localizzata in buca, lungo la fila o in banda) seguita da una leggera incorporazione nel terreno (2–10 cm). Dopo l'applicazione è utile effettuare una irrigazione (o intervenire prima di una pioggia) per favorire l'attivazione dei microrganismi.

Dosi indicative:

- Orticole e floricole trapiantate: 10–20 g per pianta, con possibile seconda applicazione nelle colture lunghe o su terreni poveri.
- Piante in vaso: 5–15 g per vaso in base al volume del contenitore.
- Arboree: distribuire sottochioma/sottofila con leggera incorporazione e irrigazione; dose: 10–20 g per pianta.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati, in ogni caso è sempre bene effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

AVVERTENZE

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 30°C. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

CONFEZIONE

Busta da 1 kg

Disponibile, su richiesta, anche in confezioni di peso diverso



Fertilidea srl